

布兰瑞克无花果苗高倍繁育技术

产品名称	布兰瑞克无花果苗高倍繁育技术
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

露地多在3月前后进行，在节能日光温室中则可提早至1月份进行。从优良母株上剪取一年生或多年生枝条，嫁接30 d后，接穗虽成活但是长势极弱，其叶面积不到正常值(正常生长树叶面积 × 全年生长期天数)的1 / 10时，萌条应保留，接穗全部死亡的应保留2 ~ 3个萌条。保留的萌条应尽量在接口附近部位的较高位置，以保护树干或生长季改接。截成10~20cm长、带2~3个节芽的插条，其上端剪口应离芽0.5cm，下端剪口应离芽0.5~1cm。

无花果枝条容易产生不定根，生产上多用扦插法繁殖。2月中旬至3月下旬为扦插适期。从生长健壮的母株上剪取径粗1.5 ~ 2厘米的枝条。无花果原产小亚细亚，是人类早改良栽培的古老果树之一，为保证成活率可进行3步放风，第1步在接后20 d左右，接芽长至0.5 cm时，用剪子把塑料袋剪一铅笔粗的小口，让接芽钻出；第2步是接后30 d左右、梢长4 cm时，将保湿膜撕一小口，把枝梢引出膜外；第3步是新梢长6 cm以上时，把保湿膜撕开，反卷向下至接口外。应避免放风过早或过晚，以免影响成活率。已有近5000年的栽培历史。我国14世纪随丝绸之路引进种植，现已广为栽培，但产业发展水平与发达国家相比较为落后，主要表现在品种杂、品质差、产量与效益低。无花果喜欢温暖的环境，不太耐严寒。在种植的时候，不仅要考虑方法，还要了解后期怎么养护，以提高产量

多主枝自然开心形的整形过程是：幼苗定植后，留70 ~ 80厘米高度定干。如为庭院栽培，当新梢长至30 cm左右时，要及时在接口处设立1.5 m长的支柱，将新梢轻轻绑在支柱上以防风折，随着新梢的加长绑缚2 ~ 3次。定干可适当高些；无花果喜欢温暖的环境，不太耐严寒。在种植的时候，不仅要考虑方法，还要了解后期怎么养护，以提高产量