

# 金傲芬无花果苗枝条类型及特性

产品名称	金傲芬无花果苗枝条类型及特性
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

如若仍有杂草滋生，可行刈割，将草覆盖根际，冬季可选适当作物进行间作。在冬季气候寒冷地区，应注意防冻，塑料微膜袋价格低廉，可以减少套袋的投资，但其提高果面质量的效果不如双层纸袋，且易发生日灼，尤其缺乏灌溉条件的旱地果园，遇到高温干旱天气，日灼现象更加严重，应当注意。如新疆每年冬季将枝条压向一边或四周，上面覆盖草类后，再埋土，即可安全过冬。

坊间还流传着不少它的英雄事迹，其中早可以追溯到夏娃和亚时期（够早吧），当他们偷食禁果意识到羞羞脸后，他们就使用无花果叶子遮挡了身体重要部位（不过无花果树的汁液沾到皮肤上奇痒无比，童鞋们不要模仿哦）。套袋结束和刮风下雨天气之后，均应普遍检查一次。检查袋口是否绑扎严密，膨鼓的纸袋是否变型，有无幼果贴靠袋壁现象。每隔10-15天还应开袋抽查一次，检查袋内有无害虫(套袋时将虫、卵套入，或袋口绑扎不严，害虫钻入袋内危害)及病害发生，是否出现日灼现象等。发现问题，可根据危害程度采取必要的措施。无花果叶子的使用标志着人类羞耻心的诞生，有色思想的萌芽。果实口感清甜软糯（属于清甜型的，不是那种特浓甜的），生长快，结果早，果型大，关于丰产（部分花友反应丰产差），夏果一般在7月份成熟，发育期为64天。秋果在8月份成熟，发育期为62天。

无花果根系的伸长、充实和呼吸强度有关。土温10 左右根系开始活动。在江苏，5月中旬为活动盛期，6月中旬为生长高峰期；每667m<sup>2</sup>施入鸡粪(必须是腐熟好的)2000—2500Kg，磷酸二铵20—25Kg，50%的硫酸钾面10—15Kg(或硫酸钾型优质复合肥50Kg)，硼砂1—1.5Kg，硫酸锌1.5—2Kg。5月中旬和6月下旬是春根生长快的时期。一般在无花果种植条件中，给其种植的环境温度也非常主要，千万不要盲目的给其种植