

# 波姬红无花果苗供应价格，波姬红无花果苗供应批发及单价

产品名称	波姬红无花果苗供应价格，波姬红无花果苗供应批发及单价
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	4.50/棵
规格参数	品种:无花果苗 产地:山东 级别:良种
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

## 产品详情

波姬红无花果苗供应价格，波姬红无花果苗供应批发及单价 疫病是近年来无花果的主要病害，发生普遍，危害严重。病害流行年份，可使80%至90%果实受害腐烂，大量枝叶枯萎。危害症状 该病主要危害果实、新梢和叶片，亦可侵害嫩芽。受害初在果实表面产生水渍状圆形病斑，随后迅速扩大，呈稍凹并且不规则形腐烂病斑。当病斑扩展到占全果二分之一以上时，果实即会脱落。病果落地后干缩成僵果。新梢受害时产生水渍状褐色病斑，当病斑环绕枝梢一圈时，新梢即干枯死亡。

发病规律 病菌以卵孢子在遗留地面的寄主病残组织内越冬。第2年春夏之际，经雨水传播到靠近地面的新梢和果实，并发芽侵入开始危害。以后在病斑上产生孢子囊和游动孢子，借风雨媒介作用，进行重复侵染，直到秋季形成卵孢子并越冬。凡果园地势低洼，排水不良，树干低矮丛生，枝条过密而郁闭的发病则重。

防治方法 1.清洁田园、肃清越冬菌源。春季认真做好清园工作，剪除枯枝、病残枝，清扫地面落叶和病残组织，集中烧毁处理，并喷洒3波美度至5波美度石硫合剂。 2.药剂保护。自5月下旬起，直至果实采收前20天，每隔15天至20天喷1次药。药剂可用40%霉疫净可湿性粉剂300倍液，或50%瑞毒霉可湿性粉剂800倍液，或58%瑞毒霉锰锌可湿性粉剂800倍液；1 1：200波尔多液也有较好防治效果，可以前期用波尔多液保护，发病后用瑞毒霉等防治。此外，还可用50%福美锌可湿性粉剂400倍液至500倍液防治。 3.加强田间管理，作好开沟排水工作。降低田间湿度，疏除过密枝条，适当提高结果部位，改善树冠通风透光条件。