

# 斯特拉无花果苗高倍繁育技术

产品名称	斯特拉无花果苗高倍繁育技术
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

在3月下旬或4月初进行嫁接，嫁接时可以选择枝接法和芽接法，枝接法成活率高，芽接法操作较简单，嫁接苗愈合的适宜温度是25 左右。从嫁接到伤口愈合，第1片真叶展开是嫁接成活的关键时期，约需要3天时间。3天以后苗床日温应维持在28~30 ，夜间为15~18 。不能在下雨天进行嫁接，下雨天空气湿度大，不利于无花果的生长，嫁接成功后要注意遮风避雨。

无花果枝干光洁，树姿优美，叶形独特，而且果实香甜可口，营养极为丰富，具有较好的观赏价值，是良好的园林及庭院绿化观赏树种。而且当年栽植当年结果，非常适宜阳台庭院盆栽，是较好的观果植物之一。嫁接后小弓棚用遮光物覆盖[来源:www.nczfj.com/]，3天后可早晚揭掉遮光物，之后视苗情情况逐渐增加透光度，延长透光时间，6~7天后可以完全撤去遮光物。2019无花果市场行情怎样无花果近几年的市场行情还是很不错的，从往年的市场数据看，无花果从上市之初的5月份到下市的11月份，市场价格也是出现从十元到十几元一斤的变化，有的品种价格会更高一些斯特拉无花果苗是近些年新开辟推广的无花果品种。其突出特点是优良的品质，几乎不裂果，丰产性强的水果;和病虫害少，几乎没有农药，当三年产生经济效益的成果是巨大的种植。

无花果地栽第1年可以在40公分时打顶，也可以不打顶，等到冬季结束后再定干截枝。无花果打顶一般在夏季进行，嫁接前苗床应浇透水，保持棚内湿度在95%以上。如果湿度过低，可用喷雾器向地面喷水，但忌在伤口愈合前向嫁接苗株上直接喷水。约10天后嫁接苗基本成活，可以用喷壶直接喷水。将顶芽摘除后还会有很多侧芽，侧芽会快速萌发生长出侧枝干。