

黑鸡苗 黑鸡苗批发 黑鸡苗价格 快大黑鸡苗 黑鸡苗供应 良凤花黑鸡苗

产品名称	黑鸡苗 黑鸡苗批发 黑鸡苗价格 快大黑鸡苗 黑鸡苗供应 良凤花黑鸡苗
公司名称	成都天鑫力禽业有限公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:4.6 (kg) 成都:98%
公司地址	成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号
联系电话	17369032651 18030449395

产品详情

夏季肉鸡采食量低的原因主要包括温度过高，肉鸡长期处于热应激的状态下，养殖环境较差，通风不良，饲喂不合理，营养的摄入不足或者不均衡、肉鸡患有疾病，还有一方面的原因就是肉鸡自身的原因。根据引发肉鸡采食量下降的原因，有针对性的采取有效的措施来提高肉鸡的采食量，对于提高肉鸡的生产性能非常重要。

一、热应激因素

夏季高温季节，天气较为炎热，尤其是对于笼养模式下，饲养密度大，温度相对较高，鸡舍内的温度难以调整到适宜温度，肉鸡长期生活这样的环境下会发生热应激反应，会出现一系列的不良反应，其中

我公司主要经营土鸡苗，芦花鸡苗，青脚麻鸡苗，九斤黄鸡苗，天露黑鸡苗，绿壳蛋鸡苗，乌骨鸡苗，肉鸡苗，新广K901鸡苗，黑鸡苗

为明显的就是采食量下降。肉鸡在热应激状态下采食量下降的主要原因是：鸡在采食饲料后会产热，这会增加额外的温度，而鸡出于自我保护，就会减少采食。夏季高温肉鸡饮水量增加，通过饮水排泄带走热量，而大量的饮水会造成肠道内的菌群失调，从而降低了肉鸡胃肠的蠕动功能，使消化能力下降，终导致采食量下降。

夏季为了提高肉鸡的采食量，首先要做的就是控制好鸡舍内的温度，给肉鸡提供一个舒适的体感温度为核心，采取综合有效的措施来降低鸡舍的温度。其次，利用辅助类产品进行预防，