

陕西黑土鸡苗养殖 渭南土鸡苗养殖 安康青脚麻肉鸡苗批发 榆林快大黄鸡苗

产品名称	陕西黑土鸡苗养殖 渭南土鸡苗养殖 安康青脚麻肉鸡苗批发 榆林快大黄鸡苗
公司名称	成都亿鑫和进出口贸易有限公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:5.2 (kg) 成都:98 (%)
公司地址	四川省成都市蒲江县寿安街道五会村3组37号 (注册地址)
联系电话	17369032651 17721957263

产品详情

夏季高温期，开产的鸡群体重要略高于标准(30~50g)从开产到整个产蛋高峰对鸡群都是一个很大的应激，需大量的营养物质来满足生理和产蛋的需要，除了消耗每天摄入的营养物质外，还需动用体内的储备，如果天气炎热，鸡群采食量会明显下降，这样正常的营养摄入量远远不能满足产蛋高峰的需求，势必会大量动用体内营养，造成产蛋疲劳症。因此，要对炎热季节开产的鸡群，适当增加体重以减少因炎热采食量不够所引起的疾病。

02

讲究点二：

深夜开灯，增加采食和饮水，减少热应激，白天天气炎热，鸡群采食量大大下降，深夜天气凉爽，有利于鸡群采食，所以可以在灭灯4个小时后开启光照0.5~1小时(增加的光照不记入总光照程序之内)。这种方法的优点：一是增加采食量，弥补白天耗料的不足;二是鸡只充分地饮水和活动，减少中暑死亡。

03

讲究点三：

早上和上午的采食量要充足 早上气温较低，所以尽可能抓住有利时机给予充足的饲料。首先晚上喂料要足，保证鸡只醒来时就有料吃，其次是早上喂料时间要早(早上6:00以前必须喂完次料)，保证在鸡只产蛋前采食更多的饲料，这样做可以很好地弥补耗料不足的问题。

04

讲究点四：

全天给予充足清凉的饮水，防止中暑和脱肛炎热夏季鸡只每天都要饮用大量的水，以补充因散热而丢失的水分，并且调解体液平衡，防止酸中毒。另外，鸡群每天的产蛋是一个复杂的生理过程，需要大量的水来参加，轻度缺水可以引起难产和产蛋减少，重度缺水则可造成产蛋大幅度下降甚至中暑死亡。

05

讲究点五：

日采食下降，注意饲料中钙、磷、能量等营养物质的浓度 炎热环境下，随着饮水量和泌尿量的增加，体内钾、钠排泄量增加，因此需要相应提高饲料中钾、钠的含量。根据每天日耗配比日粮，适当时可以增加一些营养元素的添加量。补加钾、钠需要全天饲喂，补充钙磷在下午3 00以后饲喂。热应激时，鸡只采食量下降，提高日粮浓度可部分克服由饲料采食不足而导致的生产性能降低。与蛋白质和碳水化合物相比，脂类物质可以降低体增热，因此可在日粮中添加油脂。添加量以日粮的1%~1.5%为宜，以必需脂肪酸含量较高的植物油脂为佳。补加油脂时需间歇性添加，如喂3天停3天。育成鸡添加3%的高纤维饲料，目的是把胃撑大，特别是白壳蛋鸡。维生素C是鸡只合成皮质类固醇激素的原料，热应激条件下。维生素C合成减少，但鸡只对皮质类固醇激素的要求增加，所以可在饮水或饲料中添加0.02%~0.04%的维生素C，缓解热应激，提高产蛋率和改善蛋壳质量。

我公司主要经营芦花鸡苗，青脚麻鸡苗，良凤花鸡苗，快大黑鸡苗，土鸡苗，绿壳蛋鸡苗，麻鸭苗，番鸭苗，鹅苗，骡鸭苗，花边鸭苗