

蓝莓苗病害防治措施

产品名称	蓝莓苗病害防治措施
公司名称	泰安市建岳农业科技有限公司
价格	5.00/颗
规格参数	品种:蓝莓苗 型号:3年 产地:泰安
公司地址	山东省泰安高新区北集坡办事处季家庄村（注册地址）
联系电话	0538--8912239 18562357999

产品详情

华南蓝莓产区；以广东、广西、福建沿海为主，主要适宜发展兔眼蓝莓品种。兔眼蓝莓品种果大，风味比高丛蓝莓略差，但果实成熟期在6月至7月份，此期间正是国际市场上蓝莓鲜果供应空档时期。推荐品种有佛罗达蓝、粉蓝、园蓝、梯芙蓝、蓝宝石等。

蓝莓苗病害防治措施:选用抗病品种，或选种早熟、晚熟品种，避开多雨季节开花。搞好园区清洁工作，结合冬季修剪清除田间病株残体等，要做到彻底清园并集中烧毁。在生长季发病，要及时摘除病叶时、病果等发病部位，并进行喷药，防止病菌的再次侵染。阴雨天避免浇水，温室内要加强通风排湿工作，控制设施内的空气相对湿度小于65%，可以有效地防止和减轻灰霉病的发生。由于蓝莓枝梢萌发力大，因此要加强抹芽、摘心等管理，增加通风透光次数，降低树体内部湿度，从而达到减轻病害流行的目的。不偏施氮肥，防止树势徒长，增强植株自身的抗病能力。蓝莓花谢后，有些品种残花不容易脱落，应及时清除残花或用棍棒轻敲树体震落残花，减少二次侵染来源。药剂防治花期开始喷药，可用40%嘧霉胺可湿性粉剂750~1 000倍液、50%腐霉利可湿性粉剂1200~1 500倍液。但果期禁止喷药，避免造成农药残留。

蓝莓修剪是蓝莓栽培的一项重要工作，修剪的目的就是使蓝莓能够每年都高产出优质的果实。整形修剪，能够改善光照和通风条件，增强光合效率，促进花芽形成，并能通过疏除部分花芽避免结果过多，增大果体，提高坐果率。反之，不修剪，不仅坐果率降低，果实品质变差，而且会使树势开张的品种结果枝负担过重而落果，从而导致采收困难，果实容易带泥土。此外，通过修剪疏除部分病死枝、老弱枝和过密枝条，也使采收等田间操作更方便。

蓝莓的修剪具有双重作用，即局部的刺激作用和整体的削弱作用。从局部来讲，修剪能够使新梢的长度增长，刺激花芽枝条形成。但不要修剪过重，会损害蓝莓根系发育。

蓝莓苗休眠期修剪管理:的蓝莓贮藏营养主要在根系内，此时修剪对树势和根系的影响要小于生长季修剪

，但是对修剪部位的局部刺激作用更强于生长季修剪。因此，休眠期修剪对于成年树和衰弱树出较适合，而对于幼旺树则应尽量少采用。休眠期内修剪越早，开花期越早，不修剪的蓝莓树开花早。根据这一规律，可以适当晚剪以推迟花期避免晚霜的危害。休眠期是我国蓝莓产区普遍采用的修剪时期，这一时期修剪，叶片已经脱落，枯条的状态和花芽都便于识别，修剪方便，也利于判断下一年的产量。种植者习惯这一时期进行修剪，甚至有的种植者在一年中只进行一次休眠期修剪。

蓝莓休眠期修剪方法

- 1.短截剪除蓝莓一年生枝条的一部分，可以分为轻截、中截、重截。轻截为去除一年生枝条的1/3以下，为轻为剪除一年生枝条的 1/2左右。重截为剪除一年生枝条的2/3以上。
- 2.回缩 剪除蓝莓多年生枝的一部分。
- 3.疏枝 将蓝莓一年生或者多年生枝全部剪除。
- 4.长放 对一年生枝不修剪。
- 5.疏花芽去掉蓝莓结果枝上的一部分花芽。

凡是在蓝莓生长季节进行的修剪都称为生长季修剪，包括早春树液开始流动而没有萌芽长叶的时期。生长季修剪对局部的刺激作用较小，修剪反应比较温和，但是对树体总的生长量和根系的抑制作用要比休眠期修剪大，所以适合幼旺树或者生长健壮的树，而不适合衰弱树。生长季修剪可以为了整形、改善光照，也可以是为了增加分枝数量、扩大树冠、增加结果枝数量，还可以改变结果枝的类型、利用二次枝结果等。种植者可以根据不同的目的在生长季灵活采用。蓝莓生长季修剪应该与休眠期修剪相结合，生长季修剪及时的果园，可以极大地减少休眠期修剪的工作量，特别是对幼旺树早期结果，提高早期产量具有极为重要的意义。除了衰弱的蓝莓植株以外，蓝莓修剪建议以生长季为主，休眠期为辅。