

朱砂红樱桃苗新品种

产品名称	朱砂红樱桃苗新品种
公司名称	泰安高新区恒泰苗木园艺场
价格	4.50/个
规格参数	品牌:恒泰苗木
公司地址	山东省泰安市高新区
联系电话	15005485828

产品详情

朱砂红樱桃苗新品种2、准备基质：要用疏松肥沃的土壤作扦插基质，可以将泥炭土，蛭石和河沙混合均匀。3、插入土壤：将准备好的扦插条插入土壤中，插好后要将扦插条放置在避光处，大约2个月左右的时间就能生根。枝干患病部位子实体连同树皮一起刮掉（刮至木质部），带出园外集中烧毁，并在伤口处涂抹杀菌药，可用1%硫酸铜液消毒或43%戊唑醇悬浮剂500倍液进行涂抹。

拉枝开张基角，可以正拉

（即拉开的枝条在主干与原主枝所确定的平面内）；基角很小或稍有夹劈的枝条切忌正拉，要侧拉（枝条拉开后垂直主干与原主枝所确定的平面），可以有效减少拉劈现象。

甜樱桃露地栽培中，除了前文提到的涝害、冻害及鸟害以外，在生产实践中，还有除草剂危害、盐碱危害、风害及晚霜危害等。优质的鸡、猪粪或人粪尿数量可少一些，用杂草、树叶等土杂堆肥数量就要多一些。施基肥的方法是：对幼树可用环状沟施法，在树冠的外围，投影处挖宽50厘米、深40~50厘米的沟将肥料施入。

树盘覆盖最适宜山地果园。土质粘重的平地果园及涝洼地不提倡覆草，因为覆草后雨季容易积水，引起涝害。另外，在治虫打药时，要同时打一下覆盖物，以消灭潜伏在草中的害虫。

干腐病后期导致流胶 溃疡型溃疡型流胶病，病部树体有树脂生成，但不立即流出，而存留于木质部与韧皮部之间，病部微隆起，随树液流动，从病部皮孔或伤口处流出。