

美国都克北高丛蓝莓苗枝条类型及特性

产品名称	美国都克北高丛蓝莓苗枝条类型及特性
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

蓝莓中的花青素可以促进视网膜细胞中的视紫质再生，预防近视，增进视力。所以每当到了三四月份的时候，就能看到蓝莓花盛开了。过量施肥极易使蓝莓树体受到伤害甚至整株死亡，因此，施肥量的确定要非常慎重，必须根据土壤肥力及树体营养状况而定。蓝莓苗结果时间：蓝莓原产于北美洲，现今世界上将近90%的蓝莓产品来源于北美。它不仅具有良好的营养保健作用，还具有防止脑神经老化、强心、抗癌、软化血管、增强人机体免疫等功能。

在施肥时间上力求“早”，一般在10月中旬至11月中旬施肥，以施有机肥为主，优选牛粪，还可选用氨基酸、蚯蚓粪、大豆有机肥等，一般亩施800-1200千克，采用撒施，不建议沟施，因为蓝莓根系浅，开沟施肥易损伤根系。蓝莓幼树一般以去花芽为主，目的是扩大树冠，增加枝量，促进根系发育。定植后第二、第三年春疏除弱小枝条，第三、四年仍以扩大树冠为主，但可适量结果。一般第三年株产应控制在1公斤以下，以壮枝结果为主。但兔眼蓝莓果实种子与高丛蓝莓相比更加明显。该品种群的品种树体高大，一般高2~3m，寿命长，耐湿热，抗旱，但抗寒能力差，对土壤条件要求不严。适应于我国长江流域以南、华南等地区的丘陵地带栽培。需冷量一般为450~850h。

增强了蓝莓根系的吸收、合成和分泌等功能，可缓解蓝莓生长缺素症状和极端气候对蓝莓的危害，蓝莓根系分布浅，喜湿润，及时灌水十分必要。蓝莓灌水需要注意水源和水质，深井水一般pH值偏高，且钠和钙含量高，长期使用会影响蓝莓的生长和产量，可在灌水时用硫酸将pH值调5.5左右再灌，但应约间隔3次灌水再灌一次酸水。供给蓝莓营养生长及生殖生长所需求的营养，改善蓝莓果实品质提高产量。