

美国都克北高丛蓝莓苗定植前的小妙招

产品名称	美国都克北高丛蓝莓苗定植前的小妙招
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

北美的丰收季节是从四月中旬到十月上旬，丰收是在7月，所以7月也是闻名的蓝莓月。培育品种要求120-160天无霜冻的天气才能让果实成熟。可以在蓝莓休眠期将地上部分全部烧掉，重新萌发新枝，当年形成花芽，第二年开花结果。以后每2年火剪一次，始终维持壮枝结果。新推荐高丛蓝莓品种，早熟品种，可以与‘蓝丰’配合栽培。树体生长健壮、直立，连续丰产。

南高丛蓝莓品种——低需冷量品种南高丛适宜夏季较热、每年冷量低于1000小时的气候区域。在表中列出了各个品种大约小需冷量（冬季低于7.2（45°F）的小时数）。扒开垄面覆盖物(锯末、松针、树皮、秸秆等)露出土面，成龄蓝莓树修剪主要是控制树高，改善光照条件，以疏枝为主，疏除过密枝、细弱枝、病虫枝以及根蘖。根势较开张品种疏枝时去弱留强；直立品种去中心干，开天窗，留中等枝。大枝结果佳结果树龄为5~6年生，超过要及时回缩更新。弱小枝抹除花芽，使其转壮。成年树花量大，要剪去一部分花芽，一般每个壮枝留2~3个花芽。在离蓝莓树基部20厘米以外均匀撒施有机肥，然后浅耩，随后重新覆盖好覆盖物。近年来，设施栽培生产的蓝莓颇受水果市场的青睐，究其原因不只是蓝莓独特的营养价值，还有它提早成熟的时间优势。现将蓝莓大棚生产的关键技术环节

有机物覆盖使水土和养分流失状况得到改善。作物秸秆等覆盖物避免了降水对地表的直接冲击，也可以在蓝莓早春萌芽前，从植株基部将地上部分平茬，全部锯掉，锯下的枝条保留在果园内，可起到土壤覆盖和提高有机质的作用。降水就地入渗快，地表径流少。在国内外市场上需求量呈急速上升的趋势，各国蓝莓产业蓬勃发展，我市蓝莓种植已呈上升之势。