

美国都克北高丛蓝莓苗生长期温度管理技巧

产品名称	美国都克北高丛蓝莓苗生长期温度管理技巧
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

蓝莓苗种植户会非常关心蓝莓苗几年结果这个问题，在采购蓝莓苗的时候，也务必要问清楚蓝莓苗是几年生的、什么时候能结果。蓝莓的定植穴大小因栽培种类而异，兔眼蓝莓应大些，一般 $1.3 \times 1.3 \times 0.5$ m；高丛蓝莓的定植穴长宽深规格为 $0.5 \times 0.5 \times 0.4$ m；半高丛蓝莓和矮丛蓝莓可适当缩小。早熟品种中大果果实成熟期基本一致味甜大酸度小采收后果香独特。果粉厚浅蓝色外形美观与其他品种比较耐储运。树木特征明显树木强势直立型。

南高丛蓝莓喜湿润、温暖气候条件，需冷量低于600h，抗寒力差。适于我国黄河以南地区如华东、华南地区发展。与兔眼蓝莓品种相比，南高丛蓝莓具有成熟期早、鲜食风味佳的特点。浇越冬水的时间不宜过早或过晚，花青素可以提高在昏暗灯光下的视力；对于夜间驾车者，长时间注视屏幕的人等都有帮助。在蓝莓的成熟紫黑色浆果中，有超过15种的花青素的成分，能有效抑制破坏眼部细胞的酵素，这也说明了蓝莓为什么有益于眼睛的健康。浇水早了气温偏高土壤水分蒸发量大，降低浇越冬水的效果；浇水过晚因地面封冻而影响水分下渗，积水成冰会影响蓝莓根系呼吸。蓝莓在温度低于7.2℃时，就会进入自然休眠阶段，暖棚现有品种的休眠时间一般要达到800-1200小时，休眠时间不足会影响开花和坐果。

覆盖后近地表空气湿度增加。由于覆盖物有效保蓄了自然降水及人工供水，土壤长期含水量提高，定植穴挖好后，可以用园土与掺入有机物混匀填回。通常这项工作结合土壤改良措施一同进行。定植前应进行土壤测试，如缺少某些元素可将肥料一同施入。挖栽植沟更有利于蓝莓根系后期生长发育，为高产稳产奠定良好基础。覆盖后近地表的空气湿度比未覆盖裸露地表的空气湿度较稳定，改善蓝莓生长微环境，这对于防止花期霜冻、干热风有一定作用。