

珠宝蓝莓苗枝条类型及特性

产品名称	珠宝蓝莓苗枝条类型及特性
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

蓝莓苗种植宜选择东坡、南坡地的中、下部，坡度小于30°。种植地土壤疏松、肥沃、排水性好，且有良好的排灌设施。樱桃小番茄种子消毒及浸种催芽方法：用50-55℃水烫种，不断搅拌，直至水温度25℃后再浸泡6-8小时，捞出用湿布包好，放到27-30℃温度下催芽，每天冲洗1-2次。种子露白后即可播种，如果蓝莓幼苗更多采用聚类方法，可以将2~3个菌株一起种植，以获得早期高产，每株植物都是主要分枝，增加了结果面积，提高了收入

为晚熟品种，生长快，易栽培。果粒大，有香味。果肉紧实，耐贮藏、耐运输。果柄长，易采收。果蒂痕小、湿。产量中等。蓝莓果的糖酸比值很大。一般来说经过多年选种栽培的植物，其糖酸比值均较大。樱桃小番茄多采用双干整枝，即第1花序下选留1个侧枝，其余侧枝除去。在去侧枝时，待其长到6-8厘米及时去掉。如果打叉过早，易造成植株早衰；如果打叉过迟，易造成营养消耗，植株徒长，影响坐果。日光温室内周年栽培时，植株长高后要及时落蔓、盘蔓，适时打掉结果枝以下的枯、老叶片。用于鲜食的，都希望糖分多一些。用于加工食品时希望含酸量稍高些，这样在配料、加工时也有一定好处，无需再添加酸类成分。全面调整就是对种植园全面改良，将硫磺粉全面均匀地撒在土壤表面，结合深翻拌入土壤表层。生产上通常以调整土壤的pH值为基准，一般壤土每m²降低pH，需要施入g硫磺粉。

蓝莓需水高峰期在花冠脱落后初两周和采收前后两周，在此期间就是轻度缺水也会严重影响产量。蓝莓在果实成熟期，苗期水分管理。播种后保持土壤湿润，移苗时浇透水。缓苗后表土见干时浇水，保持土壤水分，空气相对湿度控制在60%-70%之间。也是新稍旺长期，是蓝莓水分需求的临界期，需求可相当于高达全年55%的水分需求。