

绿宝石蓝莓苗定植前的小妙招

产品名称	绿宝石蓝莓苗定植前的小妙招
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

土壤水分影响土壤中离子的溶解度、土壤氧化还原状况，也间接影响离子的吸收。当土壤处于干旱状态时，早春育苗应注意保温，出苗前苗床地温控制在25-30℃，夏季育苗应防雨、降温。当大部分种子出苗后要及时降温，温度控制在白天20℃、晚上12-15℃。当幼苗长出2片真叶时分苗。无机态养分的浓度相对提高，影响作物根系对养分的吸收。几乎所有蓝莓的细根都有内生菌根真菌的寄生，从而克服蓝莓根系由于没有根毛造成的对水分及养分的吸收困难。

高灌蓝莓和兔眼蓝莓可采用沟施，深度以10~15厘米为宜。矮灌蓝莓成园后连成片，以撒施为主。土壤施肥时期一般是在早春萌芽前进行，可分2次施入，在浆果转熟期再施1次。蓝莓苗的土地宜选择土壤疏松、壤质或沙质、排水良好的地块，早春温度渐高，分苗床一般不用铺地热线。早春分苗应在晴天上午进行，采用暗水栽的方法，先开沟，再浇水，待水渗下后放苗、埋土。埋好后表面看不到泥水。株行距10×10厘米。夏季分苗在傍晚或阴天进行，方法同早春分苗。栽后灌水，畦上遮阳，待缓苗后去掉覆盖物。地形以平地 and 10度以下的缓坡度为合适，忌用容易积水的低洼地。开花前期是蓝莓生长过程的重要事项，此时也是关系到蓝莓的开花结果，在开花前期的时候，枝叶生长密集，腋芽鳞片裂开，叶芽端会露出2~5公分的绿色组织，这时候要适当的加大肥水管理，以促使开花。

整形是修剪的基础，其目的是为了解决树与树之间，枝条之间的关系及管理利用光能的问题。整形要做到“因树修剪，随枝作型”分苗床温度在缓苗前白天25-28℃，晚上15-18℃；缓苗后白天20-25℃，晚上13-15℃。早春不浇水，夏天分苗床经常浇水。幼苗长至8片真叶时定植。做到有型不死，无形不乱。夏末和秋季是蓝莓花芽形成的关键时期，因此夏季蓝莓果实采收后的及时修剪对蓝莓第二年的结果十分重要。

。