

绿宝石蓝莓苗生长期温度管理技巧

产品名称	绿宝石蓝莓苗生长期温度管理技巧
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

白天的长度、温度和植物本身的生长情况都是影响叶腋处的芽发育成花芽或叶芽的影响因素。保护地栽培温度比普通番茄高，晚上要求10℃以上，白天为20-25℃，高不高于35℃。研究表明植物的叶和芽中的色素能够感知白天的，秋天白天变短，叶芽逐渐转变成花芽。

近年来，众多的研究已证明，菌根真菌的寄生对蓝莓生长是有益的。应该避免使用硝酸铵和包含硝酸盐的肥料，因为硝酸根离子对蓝莓的危害非常大，高浓度的硝酸盐和氯化物会对蓝莓造成毒害，所以在施用钾肥时应禁止施氯化钾，早春气温低时授粉不良易落花，可用2·4-D涂抹刚开放的花萼及花柄（只需涂抹1次）。樱桃番茄每穗开花结果较多，选留坐果良好的20-30个果，其余去掉。应施硫酸钾。蓝莓喜欢尿素和磷酸二氢铵，移栽时间7月上中旬。整地前每亩施优质有机肥2500-4000公斤，复合肥50-80公斤，磷肥50公斤，均匀撒在地上，然后做1.5米宽的畦(畦沟40-50厘米宽)，一畦栽两行。以及其他肥效释放缓慢的氮肥。所以在干旱地区采取保墒措施，可增加根部对养分的吸收。在灌区提倡合理用水对防止水肥损失和提高肥效都具有重要意义。

如果您处的灌溉用水pH值在7.5以下，但水中的盐分不得超过0.1%，氯离子含量不得超过300mg/kg。修剪对整个树体起控制和消弱作用，樱桃番茄植株高大，直立性差，当植株长至50厘米时插架以防倒伏。侧枝生长力强，一般进行双干整枝，先留2个壮枝，其它抹去。一般不打顶，当下部老叶发黄时及时摘掉以减少养分消耗。而对局部枝条起促进作用。修剪以后减去了枝条的生长点，使整体生长势减弱，叶面积减少，养分的营造也相应减少，并对根系也造成一定影响。