

天后蓝莓苗高成活率移栽技术

产品名称	天后蓝莓苗高成活率移栽技术
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

因为现在人们对蓝莓需求的越来越多，所以种植蓝莓的地方也越来越多，但是产量一直都不是理想。采用单干整枝形式，保留第1、第二花序，然后在第二花序上方留2叶摘心。使第1花序下的侧芽作为主枝继续生长，后在第四花序上方留2叶摘心，使第三花序下的侧芽作为主枝继续生长。如果土壤 pH 过高，施用硫磺粉和酸性草炭可降低到比较合适的范围。我国能够栽培蓝莓苗的地区多数土壤 pH 值偏高，需要进行土壤改良。

在选择种植地块时要首先测定土壤酸碱度，土壤 pH 值要求

4.5 ~ 5.5；若是山地要尽量选择阳坡中、下部，坡度不宜超过 25°。番茄本是匍匐性生长的作物，但在栽培中多以引架方式进行立式栽培。所以随着植株的生长延伸，距离地面越远的部分开花、坐果及果实膨大效果等表现越不甚理想，无法提高产量。针对此不良情况，可采用连续摘心法，使第1穗果重量，着花数量增加，以达到增产的目的。所选园地要求交通便利，灌溉方便。修剪以疏枝为主，疏除过密枝、斜生枝、细弱枝、病虫枝以及根系产生的分蘖、老枝回缩更新。生长势较开张树，疏枝时去弱枝留强枝，直立品种去中心干、开天窗，并留中庸枝，三年生以上枝条遵循6疏1原则，从基部疏除。若修剪过重，则会出现当年结果少，产量骤降的现象。只有合理的修剪才能达到果实产量与质量相平衡，实现早产、丰产,并延长结果年限。

根据我国气候特点和蓝莓不同品种群生长习性可将种植区域大致划分为长白山与大小兴安岭蓝莓产区、为防止种子带菌传播，播前种子要消毒，可用温汤浸种，也可用药剂浸种。温汤浸种是将圣女果种子在凉水中浸泡10分钟，然后放入50-55 的热水中，不断快速地搅动，使种子受热均匀，并随时补充热水，使水温度稳定，15-20分钟后捞出，放在凉水中散去余热，然后在25-30 温水中浸泡4-6小时。辽东半岛与胶东半岛蓝莓产区、长江流域蓝莓产区、华南蓝莓产区四个产区。