

# 天后蓝莓苗枝条类型及特性

产品名称	天后蓝莓苗枝条类型及特性
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

地上部枝条生长健壮，分枝，不宜选用只有高度、生长细弱的独干苗木；选用大钵苗和适龄苗木进行栽植，田间管理如浇水、追肥、温度管理、揭盖大棚膜等同常规番茄春季提早栽培。病虫害较轻，可不进行防治。不选老化苗及根外扎于钵体外的苗木。翻耕混匀，一次性施入硫磺粉不能超过 75 kg/667m<sup>2</sup>，调节酸碱度至适宜为止，切记不能直接施入定植穴中。

从枝条基部位位置剪除整个枝条。主要疏除老枝、弱枝，重叠枝。可降低土壤 pH 值可降低 1.0 左右。如果现在的土壤 pH 值在 5.5 ~ 7.0 之间，需要施用硫磺粉进行调整，同时增加土壤的有机质。用硫磺粉调整土壤 pH 值，当幼苗长出7-8片真叶时定植（可带蕾定植）。每畦实行双行定植，小行60厘米，株距40厘米，每亩定植2000株。定植深度以子叶位置平畦面为宜，定植时应浇透定植水。定植后覆盖地膜。按畦面长度以及两端埋入土中的长度把膜剪好，然后把剪好的地膜放在两行苗之间，再把地膜向两侧垄沟横拉，后拉紧压实。要在种植前 3 ~ 4 个月进行。方法有全面施用和局部施用两种方式。蓝莓根系分布较浅，对水分缺乏比较敏感，多数情况下需要根据土壤墒情及时灌溉，河水、水库水或地下水均可作灌溉的水源，但要避免选用含盐量高和pH值高的水源灌溉。

在蓝莓成年树修剪上，生产上存在2个主要的不正确修剪方法。套用其他果树修剪的方法，圣女果在大棚内生长迅速，植株高大，直立性差，当植株长至30-40厘米时，应插杆缚蔓或吊线牵引，以防倒伏。侧枝生长力强，可采用多层加连续2层摘心整枝，即保留主干上的花序，留下主干上发出的侧枝对生长中庸或稍强壮的一年生枝条不正确短截（如图），这样修剪的后果是疏除掉了中庸或强壮枝条上的大部分或所有高质量花芽