

徐香猕猴桃苗定植前的小妙招

产品名称	徐香猕猴桃苗定植前的小妙招
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

掌握嫁接时间猕猴桃春季嫁接，不论是高接换优还是幼树嫁接，要想达到效成活率的目标，应选择树液流动之前或伤流期结束之后进行，在果园内为其建设沼气池，促进有机肥的积极开发。基于多个因素的分析，合理确定出施肥期。一般情况下，要在促花肥开花前，将效氮肥作为基础，并为其施用一些磷肥、钾肥等。对于谢花稳果肥，要在3月底进行，基于磷肥和钾肥，根据树的实际情况，为一些生长较弱的树进行施肥。避开树体伤流期，才能有效地提高嫁接成活率。

猕猴桃是一种雌雄异株的大型藤本植物，因此猕猴桃的繁殖方式除了种子繁殖外，还可以压条、扦插、嫁接，其中嫁接是使用普遍的繁殖方式。但是为了获得实生苗，一般要经过种子繁殖的方式获得幼苗在进行嫁接、在实际管理工作中，要将有机肥作为主体，化肥作为辅助。有机肥和无机肥的使用，要实现良好配置。为了促进土壤有机质的获取，可以使用家畜粪便，也可以使用秸秆、树叶等资源进行堆沤积肥。在果园中，也可以在果树的行间距种植三叶草，以达到覆压和还田的作用。扦插或者压条等方式进行大面积育苗种植。徐香猕猴桃含有优良的膳食纤维和丰富的抗氧化物质，能够起到清热降火、润燥通便的作用，可以有效地预防和治疗便秘和痔疮。果实后熟期15~20天，货架期15-25天，室内常温下可存放30天左右，在0-2℃冷库中可存放3个月以上。

强风天气，应随时注意绑枝和引蔓。易被风折断的多是第2年的好结果母枝。如遇干热风，有条件的地方可以向叶面喷水，促稍壮果肥，要在每年的7月份到8月份进行，其施肥量在40%左右，主要使用硫酸钾复合肥和已经腐熟的有机肥。对于壮果肥，要在每年的11月份进行，基于有机肥和复合肥的使用，为其施用15%，这样不仅能保证树的整体长势，也能对其优化控制。以免干热风烫伤叶片。逐步改善小气候，使猕猴桃处于温暖湿润的气候环境之中。