

河北秦皇岛矮化鲁丽苹果苗优缺点-九州红家庭农场

产品名称	河北秦皇岛矮化鲁丽苹果苗优缺点-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1.2厘米 苗木高度:1.3-2米 鲁丽苹果苗:1.5米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

产品详情

河北秦皇岛矮化鲁丽苹果苗优缺点-九州红家庭农场矮化鲁丽苹果苗修剪分冬季修剪（休眠期修剪）和夏季修剪（生长期修剪）两类、冬季修剪的基本方法有短截、回缩和疏枝，有时把长放不剪也放在广义的修剪方法中。主枝过粗过大，超过主干的二分之一；侧枝过大超过主枝的二分之一或三分之一；背上枝组过大，形成树上树；枝头枝组过大严重影响光照和扰乱树形短截又可分轻截、中截和重截等几种不同的程度，从而其修剪反应也不同。对枝条轻短截或长放，有利于缓和枝势、树势。对枝条中截、重截或回缩，有利于促进枝芽生长和枝组、骨干枝的更新复壮。疏枝可减少分枝，改善光照，并有抑前促后的作用，有利于花芽的形成。夏季修剪包括摘心、抹芽、疏梢、扭10梢、拿枝、拉枝、环剥等基本方法。传统的大树形、多主多侧、多级次，树体60%以上的营养用在生长新梢、枝干，只有少数营养用于结果，且冠内外矛盾较多，难以调控，不便管理，树冠内膛光照差，冠内冠外果实质量差异也大。果树管理是五级结构：主干 - 主枝 - 侧枝 - 结果枝组 - 结果枝。一般来说，夏季修剪对树体生长有一定的作用，能缓和枝势和树势，常有利于花芽的形成，在幼旺树上应用较多。

矮化鲁丽苹果苗苹果幼树期的修剪以选留培养骨干枝为主，同时掌握轻剪多留辅养枝，增加枝叶量，使地上部和根系的生长早趋平衡，促进成花结果。苗木栽植后，按不同树形要求对苗木进行短截，称为定干。一般选择的多是适应性较强的品种，如胡红、朱砂垒、赵粉等。挑选三四年生的健壮植株。上盆时间根据当地气温灵活掌握，天冷时早上盆，天暖的话应适当推迟上盆时间。掌握好温度是牡丹冬季催花技术的关键。牡丹入室后，可分为两个阶段掌握温度的变化。阶段即升温阶段。入室一周后，温度掌握在8 ~ 12，然后将温度升到18 ~ 20，保持半个月，再将温度升到20 ~ 24，保持一周时间。此时花已露色，然后进入第二阶段即降温阶段，将温度降至16 ~ 18，一周后即可开花，如果花开得较快，可将温度降至14 ~ 16，以便延长花期，保证节日用花。定干时剪口下要求有5~7个以上的饱满芽，20厘米~25厘米称为整形带。这些芽前发成技后，从中选留中心干的延长技及层主枝或较粗壮的侧生枝。

每年冬季按整形要求剪截培养中心干和各级骨干枝枝头，注意剪口芽的质量和留芽方向。级次过多许多果树级次太多，传统的果树管理是五级结构：主干 - 主枝 - 侧枝 - 结果枝组 - 结果枝位于中心于层间和主枝下部的生长枝，除过密的需疏除外，其余枝条应适当多加保留，作为辅养枝，并采用轻剪长放拉平的方法，使其能辅养树体，缓和树势及早期结果。整形带以下定干当年不扶芽，

有利于主干的加速和根系的生长，发出的枝条中近地面的和拥挤的可除，其余可控制或甩放。在培养骨干、利用辅养枝的同时，在主枝、副主枝的背后、两侧及背上应及时分别培养大、中、小各类枝组，使稳定结果。没有根据树龄特性进行修剪幼树期，以快速培养树形为目的，管理上多采用短截等方法，增加分枝；盛果期以调节为主，通过适当修剪调节树体平衡、光照分布、树势的强弱等；衰老期则是尽量集中营养，采用更新、回缩复壮等方法延长结果年限。枝组在树冠内的配置做到上稀下密，内外稀中间密。初果期多培养两侧及背后的平斜枝组，盛果期后要适当多利用背上的直立枝组，以维持枝组的生长势。级次过多许多果树级次太多，传统的果树管理是五级结构：主干 - 主枝 - 侧枝 - 结果枝组 - 结果枝采用自由纽锤形树形的植株，不必培养大型枝组。矮化鲁丽苹果苗夏季修剪是缓和幼旺树长势，促进花芽分化和早期丰产的一项重要措施，要充分加以应用。

旺长辅养枝在春梢停长后和秋梢开始生长时，可进行拿枝，使枝条的木质部伤而不断，从而改变角度、方向和生长势。枝量过大、或过小果树的枝量应该在合理的范围内，过分的强调增加枝量以提高产量和过分的强调减少枝量以提高质量都是错误的旺长无花或少花的幼树还可采用春刻伤、夏环剥和秋拉枝的方法，促使成花。一般情况下，4~5年才开始少量挂果，有的果园甚至5~8年才挂果春刻伤是指春季萌芽前在浦养枝或侧生枝两侧及背后的芽上方进行刻伤，促使多萌芽；一般浇水在早晨进行，晚上浇水容易促使植株拔高。连续阴天要防止盆内积水，采用遮盖措施，以防菊株被雨水调长。矮化处理在培养多头菊的过程中控制菊苗高度是很关键的，一般每周喷洒一次浓度为1%的矮壮素（或B9）溶液，现蕾前一个月至一个半月开始喷洒，直到现蕾为止。喷洒时间选在傍晚，此时气压低、吸收好、喷洒匀。如用药后恰好在24小时内遇雨，晴天后立即补喷一次。喷洒矮壮素不但能使植株矮化，还可增加叶色。夏环剥是在5月下旬到6月上旬在主干上方或主枝、辅养枝的基部进行环剥或环割3~4圈，使在环剥口上万多积累养分，促进成花；秋拉枝是在秋稍停长前后拉大枝条的开张角度，有利于缓和枝势。枝组配备不合理在一株树上，除了各级骨干枝外，就是各类枝组，而枝组配置合理与否，直接关系到树冠的通风透光效果自由纺锤形树形侧生枝的诱引也多在这一时期中进行。秋稍停长后20天左右，对辅养枝采用剪梢和回缩内膜枝组，也可减缓幼旺树的长势，并使小枝复壮。

矮化鲁丽苹果苗进入盛果期后，当逐步转入以枝组结果为主时，对多年生长的辅养枝要逐年清理、回缩和改造。一些果园由于管理不当或病虫害的原因出现偏冠，有些果园特别是干性较弱的品种，出现歪干现象，严重影响果园群体结构和经济效益；许多果园有上大下小的问题，上部枝条多而旺，严重遮光，下部枝条光照差，难以成花结果，即所谓“上有天棚遮太阳，下面枝条不见光”特别是树冠郁闭的，要逐年落头开心和打开层间，使光透入内膛。为稳定结果防止大小年，有的修剪过轻，忽视了整形，无原则的轻剪缓放多留枝，过分追求单位面积枝叶量的增加，又造成枝量过大，主从不分，使树体结构紊乱而郁闭。夏管技术运用不当实践证明，夏剪技术运用得当，对早优质和维持良好的树形结构起着重要的作用。冬剪时要控制和保持一定的花芽和叶芽的比例达1:2~4。花芽过多之年，可采取疏芽、短截、回缩和破顶，并配合疏花疏果，不使结果过量，从而促进发枝。花芽较少之年，则尽量多保留花芽结果。树冠直立、封闭、不均衡，树势偏旺，大枝多，主从关系不明；外围枝密集，内堂枝细弱，营养枝和结果枝比例失调；树冠内堂光照不良，与生产优质果的要求相差甚远对结果枝组要不断更新复壮，疏弱留壮，细致更新，保持结果能力。总之，通过修剪要使结果枝与营养枝之间保持一定的比例。大体使每年结果枝的数量不超过总枝数的30%~40%。养分运输路线太长，无效消耗太多，费工费力当株间外围枝头开始交接，对延长枝原则上不再短截，可缩编放放，始终保持有一个生长势较强的带头枝。当树体渐趋衰老，外围新消生长量在30厘米以下时，这么庞大繁杂的结构级次就必然造成：成型时间长要及时回缩骨干枝到2~4年生部位的分枝处，促进树冠较大的更新复壮。