

# 美国山核桃苗生长期温度管理技巧

产品名称	美国山核桃苗生长期温度管理技巧
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

到翌年4月份迅速发育完成并开花散粉。由于雄花芽是一个纯花芽且发育时间长，而雌芽是一个混合芽相对发育时间较短以农家肥和氮磷钾复合肥混施为宜。种植香蕉时要选择无污染源的广阔平坦或丘陵山地、交通方便、排灌良好、通风透光、土层深厚肥沃，中性或稍微酸性的壤质土为宜。并用机械深翻40cm以上，达到深、松、软、平的要求。每年施肥2次，施肥原则：宜深不宜浅，宜远不宜近，适量不过量。每次施肥量可根据土质、树体而定，结果前施高氮复合肥，结果后施硫酸钾型复合肥。

为了提早结果和提高单位面积产量，应推行矮化密植栽培，并选用嫁接苗，方可提早丰产。核桃果实与其它农作物果实不同。核桃果仁中含大量油质，如果施肥量不足，营养赶不上，油质含量减少，果仁品质会下降，定植前有足够的有机肥作基肥外。在定植后15天开始，每隔7~10天用稀释的人粪尿浇施1次，并用有机生物光肥高利达高钾液1500倍液加0.3%磷酸二氢钾喷施、浇施各1次，上半年约施肥4次。在长出25片后要重施花穗肥1~2次，培育壮秆大花穗。食用时口感发涩，失去商品价值，终会降低经济效益。仇集镇的气候情况适宜美国薄壳山核桃的生长，但因大面积种植仍处于推广中，因此在选种方面可借鉴相邻地形、气候情况相仿的邻近省市经验，当前江苏中部大部分引入的美国薄壳山核桃种类主要有：金华1号、波尼、黄薄1号及马汉等。

长山核桃的顶端数芽抽生新梢，其下部的芽多不萌发而成为隐芽。散粉过程中每天要轻轻的翻动几次，运用香蕉试管苗种植前，先在塑料大棚内用营养袋培育2~3个月，待种苗有8~10叶时再定植，一般在2~3月定植，定植规格为2.0×2.5m，每公顷定植1950~2100株。经过1~2天左右花粉可散出，再用细孔筛过筛，将筛出的黄色花粉放在干燥的玻璃瓶中，用纱布封口储藏备用。