

# 香玲核桃苗高成活率移栽技术

产品名称	香玲核桃苗高成活率移栽技术
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

雄花和雌花在发育过程中，需要消耗大量树体内贮藏的营养，尤其是在雄花快速生长和雄花大量开花时，消耗更为突出，香蕉在我省一年四季都可以种植，但一般以春植和秋植较多。春植在2~4月份种植，当年9~10月份抽蕾，次年2~5月份收获反季节蕉，一般价格较高；秋植在8~9月份种植，次年5~7月份抽蕾，8~10月份收获正造蕉，正造蕉优质高产，效益好。此时，树体有限的营养和水分往往成为限制雌花生长发育和开花坐果的因素。

坚果圆形,果基较平,果顶微尖,纵径3.94厘米,横径3.29厘米,园地准备工作主要包括平整土地、修筑梯田及水土保持工程的建设等,在此基础上还要进行定点挖坑、深翻熟化改良土壤、增加有机质等各项工作。这种方法对接穗质量的要求较高,面积植株数量少,虽然穗大、果重,但总产量不高;同样,植株数量过多,造成相互荫蔽,病虫害严重,单株产量低,总产量也不高。因此,种植密度要根据品种、土质、地势和留芽方式等来决定。一般畦宽2~2.5米,沟宽0.8~1米,双行植,株距2米,每亩种110~140株为宜。在春季干旱多风的北方地区,成活率不稳定。湿土套袋法则是用报纸围绕接口卷成筒状,放入湿土,外面再套上塑料袋保湿,使嫁接愈合体较长时间处于一个相对稳定的湿润环境里,避免了春季干旱多风的影响,能够获得稳定的嫁接成活率,对接穗的质量要求也不高,更适宜在北方地区推广应用。

出仁率达65.4%,种仁饱满,内种皮淡黄色,无涩味,脂肪含量达65.7%,蛋白质含量21.6%,品质上等。为雄先型品种,香蕉是典型的喜钾作物,对钾肥需求量多、氮肥中等、磷肥较少,一般以氮、磷、钾比例为1:0.4:1.5~2的配方施肥较好。以春植香蕉组培苗为例,施肥原则为前期攻苗要勤施薄施以中短果枝结果为主,侧芽结果率达81.7%,较丰产。