香玲核桃苗定植前的小妙招

产品名称	香玲核桃苗定植前的小妙招
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

于11月下旬采穗条，采下后即用湿度为60%—65%的等体积消毒锯末混合，双层塑料布打包保湿，贮存于-3—0°C的恒温冷库内备用，香蕉既怕渍水，又怕干旱。因此，前期苗小时要淋水保湿润，中期生长快要勤灌"跑马水"，后期保根、保叶要保持土壤湿润。雨季要注意及时排除渍水，防止蕉园受浸。可贮至翌年4月份，后期应注意检查按穗芽子的情况，适当调低温度。另外，接穗要求充实饱满、无病虫害、品种纯正。

果实8月下旬成熟，属中熟品种，抗黑斑病、炭疽病。适宜在土层较厚、肥沃的土地条件下栽培。 在平整土地、修筑建筑梯田、建好水土保持工程的基础上，按预定的栽植设计，测量出核桃的栽植点（耕种帮建议核桃树一般以3米×3米株行距或3米×2.5米的株行距，营养生长中后期和花芽分化期则重施；前期以氮肥为主，配施钾磷肥；中、后期以钾肥为主，配施氮磷肥。在组培苗植后10～15天长出新叶时开始施肥，每造蕉一般施肥16～18次，其中薄施11～13次、重施5次。单株总施肥量为：尿素1～1.4公斤、过磷酸钙0.4～0.5公斤、氯化钾0.8～1.6公斤、花生麸0.75公斤，也可以施用香蕉专用肥3～3.5公斤。施肥方法以淋施为主，穴施为辅。具体因地理情况而定），并按点挖栽植穴。核桃的丰产栽培管理是一个综合的技术体系。从园地选择、整地、苗木处理、栽植、修剪、病虫害防治等每一个环节都作到精细管理才能实现早期丰产的目标。尤其核桃花期，正值我国北方干旱季节，水分往往成为生殖活动的限制因子，而雄花芽又位于雌花芽的下部，处于争夺水分和养分的有利位置，大量雄花芽的发育势必影响到结果枝的雌花发育。

核桃园位于北京市西郊门头沟区王平镇西王平村。该地地处门头沟区浅山区，海拔约２００余ｍ，东经１１５°５９′，香蕉生长到1米高左右时长出吸芽，每株一般能抽出4～6个吸芽。吸芽和母株是一个有机整体，吸芽的生长和母株开花的迟早会相互产生影响，因此留芽要以不妨碍母株正常生长为原则，一般除留1个吸芽作下一造结果母株外，其余的吸芽在芽长15～30厘米时用铁锹或特制的锋利刀具将其割除。北纬３９°５８′。气候属中纬度大陆季风气候，年平均温度１０．２℃，极端高温３７．６℃，低温－１９．５℃，≥１０℃有效积温３７８０℃。年日

照２６０４．７ｈ，无霜期１８７ｄ。