

## 香玲核桃苗枝条类型及特性

产品名称	香玲核桃苗枝条类型及特性
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

选用1—3年生的普通核桃实生苗，且生长良好，无病虫害，基部以上10厘米处直径1.5—3厘米，嫁接前15—20天应在砧木基部以上20厘米处水平剪砧排放伤流。断蕾应选择晴天午后进行。断蕾后2天左右进行套袋，套袋前喷一次多菌灵和乐斯本。果实套袋可提高病虫害防治效果，减少果实机械损伤，改善果实的生长环境，提高果实的质量和产量。提早疏除过量的雄花芽，可以节省树体的大量水分和养分，有利当年雌花的发育，提高当年坚果产量和品质，同时也有利于新梢的生长和花芽分化。

树势中等，树姿直立，树冠圆柱形，分枝力强，有2次生长。雄先型，中熟品种，栽植第二年开始结果，第五年进入盛果期，如果进行密植丰产栽培，科学管理，亩产高可达千斤以上。果枝率85.7%，侧生果株率88.9%，断蕾在雌花开放结束后进行，果穗的梳数根据植株生势而定，一般每穗留7~8梳，在其所留后的一梳下间隔1~2个果梳处，用利刀切断果轴(一般将花蕾切断后暂时挂在果穗上，利用其自身的重量使果穗的下部不致弯曲上翘)，然后把多余果梳中的花序除去，后的果梳只留1个果指。这样既不因多留果梳影响质量，又不致于因切断口而影响尾梳生长。每果枝平均座果1.6个。

坚果长椭圆形。年降水量约为600mm，(近30年降雨150~350mm，严重干旱)多集中于6-9月，约占全年降水量的75%

。区域内灾害性天气频繁，影响严重的是干旱，出现频率90%

以上。园地为多年撂荒山地，\*壤为山地淋溶褐\*和碳酸盐褐\*，\*层薄厚不均。

栽植穴或栽植沟，应于栽植前一年的秋季挖好，使心土有一定熟化的时间。栽植穴的深度和直径为0.8~1米。密植核桃园可挖栽植沟，6~9月份是沿海地区台风多发季节，香蕉是不耐风作物，因此，必须做好防风工作。在6月份，每株蕉都用木条或竹竿支撑。香蕉原产于热带、亚热带地区，整个生育期要求高温多湿，忌低温。沟深与沟宽为0.8~1米。无论穴植或沟植，都应将表土与心土分开堆放。香玲核桃品种平均坚果重12.2克。壳面光滑美观，浅黄色，缝合线窄而平，结合紧密，壳厚0.9毫米，香玲核桃品种可取整仁。