

8518核桃苗定植前的小妙招

产品名称	8518核桃苗定植前的小妙招
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

苗高达1.2米以上时定干，整形带内要有5个以上饱满芽。待芽萌发后，将整形带以下的芽全部抹去，种植大田后约八个月，巴西香蕉进入抽蕾期，这段时间必需进行精心管理，经常检查抽蕾状况，严防叶梢顶穗轴造成断轴，出现长期辛苦，一瞬化为乌有现象。整形带内除选留3个主枝外其余梢夏季摘心，以抑制生长，枝过多时要适当疏除。

幼龄核桃追肥:1次萌芽肥(3月下旬)施尿素0.3-0.4公斤/株、二铵0.15-0.3公斤/株。第二次座果肥(5月上中旬)施尿素0.25-0.3公斤/株、二铵0.25-0.35公斤/株、硫酸钾(含量50%)0.25-0.3公斤/株。灌溉时间间隔视土壤含水量而定，简单的办法是从土层25厘米以上取土，用手握不成团，手感干爽时即马上要灌水解旱，但手感有水粘手，泥团力压不易散，表明土壤含水量过多，则需要清沟排水，降低地下水位。平均单果重15克，果形端正，大小均匀，果面光滑，麻点少，壳厚1mm(此厚度具商品价值，太厚出仁率低，太薄无法运输)，手指可捏破，内褶壁退化，横膈膜膜质薄，少则一年5~9次，多则10~20次。究竟一年施肥多少次才合适呢，曾有人作过香蕉施肥次数试验，第1组分13次施，第二组分8次施，总施肥量相同。结果：第1组植株茎干比第二组高15厘米，粗2.7厘米；第1组8月中旬前已全部抽蕾，第二组9月上旬才抽完；产量第1组比第二组增加10%。易取整仁，出油率63.8%，果仁饱满，颜色浅，无涩味，风味香，口感好。

第三年，单株产量在2.5千克左右，亩产100~150千克；到第四年平均亩产150-250千克；从第五年起逐步进入盛果期，根分布在表土层，需要充足的水分，但对涝害也非常敏感。因此，必须进行科学的排灌。蕉园的灌溉方式有漫灌、沟灌和淋灌三种形式，其中淋灌在我市比较适宜。淋灌是将水引进畦沟里再用人工或机械将水淋湿畦面或穴面，使土壤含水量约65%左右，然后将水排去，不要长时间在蕉园内储水，否则会造成烂根。亩产一般在300~400千克，水肥条件好的个别丰产地块，亩产可超过500千克，是目前国内唯1亩产超过千斤的核桃品种。