

3公分凯特杏苗期施肥要点及用量

产品名称	3公分凯特杏苗期施肥要点及用量
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

夏季对新梢摘心刺激萌发2次枝，使树冠早成形。对新梢采用扭梢、拉枝的方式，促进幼树早结果一般主枝延长枝不留果，仁用杏的长枝甩放后，易形成势力均衡的短果枝，形成串花枝，而仁用杏以短果枝结果为主，串花枝是主要结果部位，因而对于不用于整形的长枝应多甩放，少短截刺激，以促进花芽形成，促进仁用杏早投产和早期产量的提高。徒长性结果枝留5~7个果，长果枝留4~5个果，中果枝留2~3个果，短果枝及花束状果枝留1~2个果。

花后每株追施氮肥0.5公斤、磷肥1公斤，花后两周内隔7天喷一次0.3%尿素。展叶后喷一遍净或蚜虱净3000-5000倍液。充分利用芽的早熟性，利用二次枝加速成形。仁用杏在幼树期生长旺，新梢上的芽可当年萌发，形成二次枝和三次枝，修剪时除对骨干枝延长头短截外，选择梢中上部粗壮的二次枝短截，以增加分枝，加速成形，增加覆盖率，提高光能利用率，增加光合产物积累，以利早产。花后对旺树的旺枝及时环割，每枝3-5道，间距2-3厘米。花后两周内喷3次坐果灵、0.1%硼酸、25ppm赤霉素加0.3%磷酸二氢钾、葡萄糖和300倍液防落增色剂，以提高坐果率。抹除着生不当的芽，新梢长至25厘米时摘心，时间在2月底3月初。疏去果枝基部小果、畸形果、并生果、病虫果。

将种子拌好之后，先在坑的底层铺一层湿沙，然后再将拌好的种核放进坑里，仁用杏的长枝无论甩放或短截，绝大部分芽可萌发，仅基部少数芽成潜伏芽，长枝甩放易形成串花枝，而且这些串花枝连年结果并向外延伸，维持均衡生长状态。一直到坑口三十厘米左右，上面需用湿沙填平，后再将土堆一个超出地面的土堆，土堆高度适当，防止积水。