

# 青海省三黄鸡苗批发 西宁黄花鸡苗价格 玉树良凤花鸡苗 格尔木青脚麻鸡苗

产品名称	青海省三黄鸡苗批发 西宁黄花鸡苗价格 玉树良凤花鸡苗 格尔木青脚麻鸡苗
公司名称	四川亿鑫和家禽育种有限责任公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:4.2 ( kg ) 成活:98 ( % )
公司地址	成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号
联系电话	17369032651 13320986593

## 产品详情

2012年10月份，、某养鸡户周某饲养的商品蛋鸡4500只，于185日龄发病，天出现轻微的呼吸道症状，第二天减食减水，第三天大群精神较差，而后出现以典型的大肠杆菌病变。

### 一 临床症状

发病鸡群初有轻微的呼吸道症状或无任何症状，随后出现呼噜、罗音、咳嗽、打喷嚏、甩头等明显的、轻重不一的呼吸道症状，精神沉郁、发呆、体温高、蹲伏于笼内，头颈抵鸡笼孔内或抵在笼底，逐步出现呼吸困难及张口喘息现象。鸡冠肉髯发紫、冠倒伏，严重者冠髯发绀，呈暗紫色。少部分鸡头、脸下颌部肿胀，个别见颈部肿胀。病鸡采食量开始下降，约减少60%~85%，出现严重腹泻、拉稀症状，排出绿色、白色、土黄色或绿黄色的水样粪便，肛周粘附稀粪。严重者食欲废绝，饮水量减少，鸡很快消瘦，腿部皮肤干燥。有些鸡在采食时或夜间发出尖声怪叫，病鸡倒提时从口中流出腥臭黏液。鸡粪便上覆有许多蛋黄液，在3~5天内可由90%以上的产蛋率降至40%，甚至停产。发病的第2天或第3天开始出现零星死亡。

### 二 病理变化

病死鸡羽毛松乱，鸡冠色淡或发紫，冠缘多见发绀。喉头瘀血或有散在密集的点状出血；气管内有黏液，气管黏膜局部有密集的点状出血或整个气管充血。胸、腿部肌肉见有斑状或条纹状出血，腹部脂肪表面及切面多有散在或密集的出血点。

肝脏轻微肿胀并有纤维素性渗出物，胆汁呈草绿色。心脏有纤维素性伪膜附着；脾肿胀，呈淡灰色或紫红色，表面有出血点；肾脏肿胀呈深紫色，表面有出血点；卵巢坏死、萎缩，卵泡变形，完整的卵泡表面则见瘀血或有大面积出血斑，腹腔内有糊状蛋黄液，有的因蛋黄凝固及继发感染而形成卵黄性腹膜炎

。 输卵管水肿、壁厚，内有多量灰黄色黏液，有的输卵管内有蛋清样物存留，有的输卵管内留有薄壳蛋或完整的卵黄；有的见肠系膜水肿瘀血，十二指肠黏膜水肿、出血，其它肠段黏膜充血或出血，肠内容物呈黄色或灰白色，肠黏膜脱落，直肠及泄殖腔黏膜呈现条纹状或点状出血；盲肠扁桃体肿胀、出血；怖水肿、瘀血或出血。

### 三 实验室诊断

#### 1 病料涂片镜检

无菌采取心、肝、脾组织涂片。革兰氏染色镜检，均见到大量革兰氏染色阴性、两端稍显浓染、单个散在的短小杆菌。

#### 2 细菌分离

无菌操作取病死鸡的肝、脾、气囊渗出物接种于麦康凯琼脂平板上，经37℃、24小时培养后长出半透明的红色菌落。挑取菌落做涂片染色后镜检，可见到革兰氏阴性、两端钝圆的 / 小杆菌。

#### 3 药敏试验

采用药敏纸片进行药敏试验；结果对头孢噻唑、丁胺卡那高度敏感，对氟哌酸、新霉素、恩诺沙星中度敏感；对土霉素、强力霉素、红霉素不敏感。

#### 4 新城疫抗体测定

对16份血清同时进行新城疫抗体测定，采用微量血凝抑制试验法，结果血清效价在 $4\log_2 \sim 7\log_2$ 的血清比例占87.5%。

### 四 防治

全群鸡不论发病与否全部使用家禽基因工程干扰素(8000活性单位 / 只)和头孢畜健(3mg / kg)肌注。隔24小时再重复使用一次。注意勤换针尖。

同时对全群鸡全部使用强力粤威龙(黄芩、鱼腥草、板蓝根等)每千克体重用3g饮水，鸭浆磺(白头翁、黄连、黄柏等)250g / 袋，每袋兑水150kg强补复B粉(VB1、VB2，VB6、VB12等)100g / 袋兑水50kg，连续使用5天进行治疗。

其它措施：注意通风换气，鸡舍温度、湿度适宜，增强机体的抵抗力；及时清理鸡粪，进行带鸡消毒，每日一次，连续消毒一周，对食槽、水槽、接触病鸡的人员、污染的场地等严格消毒，病死鸡深埋处理；尽量减少各种刺激引起的应激。

经采取以上措施，从第6天开始，发病数开始减少，第8天后，除个别体质较弱的鸡死亡外，没有出现新的死亡病例。

我公司主要经营土鸡苗，芦花鸡苗，青脚麻鸡苗，九斤黄鸡苗，天露黑鸡苗，绿壳蛋鸡苗，乌骨鸡苗，肉鸡苗，新广K901鸡苗，黑鸡苗，K901鸡苗，麻黄鸡苗，快大麻鸡苗批发