

# 四川省宜宾市兴文县乌骨鸡鸡苗 泸州本地乌鸡苗供应 赤水乌骨鸡养殖场

产品名称	四川省宜宾市兴文县乌骨鸡鸡苗 泸州本地乌鸡苗供应 赤水乌骨鸡养殖场
公司名称	四川亿鑫和家禽育种有限责任公司
价格	.00/只
规格参数	品种:乌骨鸡苗 体重:4.3kg 成都:98(%)
公司地址	成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号
联系电话	17369032651 13320986593

## 产品详情

鸡传染性支气管炎是由传染性支气管炎病毒引起的一种急性、高度接触性传染病。本病冬春多发，临床主要表现呼吸障碍，雏鸡易感，死亡率较高;成鸡感染可使产蛋率显著下降，造成重大经济损失。生产中须采取综合性措施防治才行。

本病各种日龄的鸡均可发病，但以雏鸡发病为严重，发病率较高，死亡率通常为20%~25%。其中，呼吸道病变型以6周龄以下鸡发病严重，肾病变型多发于3~6周龄，腺胃病变型多发于5~11周龄。饲养管理不善、饮水不足、饲料营养配比不当、过量使用磺胺类药物等，均会使鸡感病性增强，发病率增大。病鸡主要通过呼吸道分泌物排出病毒，经空气传播;被病毒污染的蛋、饲料、饮水、用具等也会传染。本病除经水平传播外，还可经卵垂直传播，鸡场一旦发生本病，很容易造成连年发生。

本病的潜伏期短，自然感染2~4天即可发病。临床主要有3种病变型，呼吸道病变型主要表现呼吸障碍、病鸡咳嗽、打喷嚏、呼吸出现啰音;肾病变型，病鸡全身皮肤发绀，骤然严重下痢，排出的稀粪中带有大量白色尿酸盐;腺胃病变型，主要特征是生长停滞，迅速消瘦，频频下痢。临床上应注意3种类型混合感染。

本病主要病理变化是呼吸道系统病变，可见鼻腔、喉头、气管及支气管内有浆液性、卡他性干酪样渗出物，粘膜充血肥厚，被大量灰白色带黄灰白色粘液覆盖;雏鸡的气管下段和支气管内有时可见淡黄色干酪样物质形成的栓子;肺一般水肿，气囊肥厚浑浊呈气囊炎;产蛋母鸡的卵子充血，腹腔可能有卵黄性物质存留，输卵管粘膜充血、渗出。2周龄以内的鸡感染传染性支气管炎病后，有输卵管持久性的损害，输卵管内1/3段产生严重的病变，输卵管的狭部和膨大部受侵害重。

如果是肾病变型，可见肾严重苍白肿大，肾小管与输尿管积聚大量银白色的尿酸盐;皮下失水干燥，肌肉发绀;母鸡的卵泡发生萎缩、充血、变形等。

腺胃病变型可见腺胃壁明显增厚，切面多汁，黏膜水肿，腺胃乳头周边出血，中央溃疡凹陷;此外，患鸡

十二指肠黏膜可见出血;肝脏表面出血甚至有灰白色坏死灶等。

防治本病，首先要严禁从疫区引种，认真搞好免疫接种。此外，还应从饲养管理着手，加强日常卫生消毒，注意鸡群密度，保持鸡舍有良好的通风和保温条件，防止过冷过热及应激反应。合理搭配饲料，保证有足够的维生素和矿物质，以增强鸡体抗病力。同时还应积极预防其他呼吸道疾病，以防并发症。

本病的病毒血清型复杂，免疫防治时，应根据毒株情况，同时结合新城疫的免疫安排，制定相应的免疫接种程序。以下接种程序可供参考：

对于主要受传统的嗜呼吸道病毒株感染威胁的鸡群，可用麻省株疫苗接种，其基本程序是：首免，1日龄，Lasota+H120活苗，滴眼滴鼻，1头份(每只用量，下同)。二免，10日龄，Lasota+H120活苗，饮水，2头份;Lasota+H120油乳灭活苗，皮下注射，每只0.3毫升。三免，25~30日龄，Laso

我公司主要经营土鸡苗，芦花鸡苗，青脚麻鸡苗，九斤黄鸡苗，天露黑鸡苗，绿壳蛋鸡苗，乌骨鸡苗，肉鸡苗，新广K901鸡苗，黑鸡苗，K901鸡苗，麻黄鸡苗，快大麻鸡苗批发