

白玉桃苗圃

产品名称	白玉桃苗圃
公司名称	泰安高新区恒泰苗木园艺场
价格	3.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区
联系电话	15005485828

产品详情

有效药剂有：10%啞蟊灵乳油3000~4000倍液、波美0.2~0.3度石硫合剂、50%多·硫悬浮剂稀释400~500倍液。桃树是最喜光的树种。常因管理技术不当造成树体郁闭，密不透光，骨干枝出现基部光秃现象，结果部位外移，并使树体极易患病并进入早衰。

白玉桃苗圃5%多抗霉素可湿性粉剂300~400倍液，50%异菌脲可湿性粉剂1000~1200倍液，每隔10~15天防治1次，共防治3~4次。

一 病害 1、桃细菌性穿孔病。遍布全国各地桃产区，排水不良的果园或多雨年份危害较重。该病由细菌引起，主要危害叶片、果实和新梢。（2）叶面喷施时添加展着剂，提高使用效果：展着剂可加速多效唑的溶解，减少流失，延长树体吸收的时间，因而在叶面喷施时，可加适量洗衣粉作展着剂。

5、拿枝：对于直立旺枝，在半木质化时反复拿捋2~3次，改变成斜生和下垂，缓和长势，促进花芽形成。、充实内膛：在树冠内膛空虚时，若有位置合适的徒长枝，可在15~20厘米处进行短截，促生副梢，改造成结果枝组，增加有效结果部位。

对生果：留向下的果、去朝天果（上图）直立品种上部多留，下部少留；大型果少留，小型果多留。一般长果枝留果2~4个（大中型果留2个，小型果留3~4个），中果枝留1~3个（大中型果留1~2个，小型果留2~3个），短果枝留1个或不留（大中型果每2~3个果枝留1个果，小型果每1~2个枝留1个果）。