

江苏扬州两刀矮化中间砧鲁丽苹果苗基地直供-九州红家庭农场

产品名称	江苏扬州两刀矮化中间砧鲁丽苹果苗基地直供-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1.2厘米 苗木高度:1.3-2米 鲁丽苹果苗:1.5米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

产品详情

江苏扬州两刀矮化中间砧鲁丽苹果苗基地直供-

九州红家庭农场两刀矮化中间砧鲁丽苹果苗修剪分冬季修剪（休眠期修剪）和夏季修剪（生长期修剪）两类、冬季修剪的基本方法有短截、回缩和疏枝，

有时把长放不剪也放在广义的修剪方法中。因此，开张角度一般也都不到位，基部枝生长过旺、过强短截又可分轻截、中截和重截等几种不同的程度，从而其修剪反应也不同。对枝条轻短截或长放，有利于缓和枝势、树势。对枝条中截、重截或回缩，有利于促进枝芽生长和枝组、骨干枝的更新复壮。疏枝可减少分枝，改善光照，并有抑前促后的作用，有利于花芽的形成。

夏季修剪包括摘心、抹芽、疏梢、扭10梢、拿枝、拉枝、环剥等基本方法。传统的大树形、多主多侧、多级次，树体60%以上的营养用在生长新梢、枝干，只有少数营养用于结果，且冠内外矛盾较多，难以调控，不便管理，树冠内膛光照差，冠内冠外果实质量差异也大。果树管理是五级结构：主干 - 主枝 - 侧枝 - 结果枝组 - 结果枝。一般来说，夏季修剪对树体生长有一定的作用，能缓和枝势和树势，常有利于花芽的形成，在幼旺树上应用较多。

两刀矮化中间砧鲁丽苹果苗苹果幼树期的修剪以选留培养骨干枝为主，同时掌握轻剪多留辅养枝，增加枝叶量，使地上部和根系的生长早趋平衡，促进成花结果。苗木栽植后，按不同树形要求对苗木进行短截，称为定干。三是：在移栽、整枝、摘心时尽量不造成伤口，为病菌提供侵入点。选晴天操作，以利伤口愈合，防止病原菌的侵入。在扦插时，应进行消毒，尽量避免通过手指及工具传播病菌。四是：合理施肥。不偏施氮肥，适当增施磷钾肥，过多施用肥料反而会对植株造成肥害甚至会造成植株黄化、生长不良。五是：注意田间卫生。将病株、病叶、杂草摘除，并带离栽培场所销毁，可降低甚至完全清除场内病原菌密度，减轻发病，尤其是对细菌性病害、病毒性病害或枯萎病等系统性病害十分有效。定干时剪口下要求有5~7个以上的饱满芽，20厘米~25厘米称为整形带。

这些芽前发成技后，从中选留中心干的延长技及层主枝或较粗壮的侧生枝。

每年冬季按整形要求剪截培养中心干和各级骨干枝枝头，注意剪口芽的质量和留芽方向。

这么庞大繁杂的结构级次就必然造成：成型时间长位于中心于层间和主枝下部的生长枝，除过密的需疏除外，其余枝条应适当多加保留，作为辅养枝，并采用轻剪长放拉平的方法，使其能辅养树体，缓和树势及早期结果。整形带以下定干当年不扶芽，有利于主干的加速和根系的生长，发出的枝条中近地面的和拥挤的可除，

其余可控制或甩放。在培养骨干、利用辅养枝的同时，在主枝、副主枝的背后、两侧及背上应及时分别培养大、中、小各类枝组，使稳定结果。各个时期的目标不一样、树体特性不一样，采用的修剪方法也就不同，生产当中，许多人不分树龄都采用同一模式，显然是不合适的。过度的强调修剪作用，而忽略其他配套措施果树管理是一个综合管理，生产中有许多人过分强调修剪作用，而忽略了其他方面（比如肥水管理方面、花果管理方面、病虫害方面等）配合措施，出现了好多问题，其实修剪只是一个调节过程，主要是调节树势、调节光照和调节负载三方面的作用，如果说这三方面没有问题，果树则可以修剪，生产中许多人对修剪的作用认识模糊，稀里糊涂的剪，并不知道为啥要剪，出现问题在所难免。枝组在树冠内的配置做到上稀下密，内外稀中间密。初果期多培养两侧及背后的平斜枝组，盛果期后要适当多利用背上的直立枝组，以维持枝组的生长势。主枝过粗过大，超过主干的二分之一；侧枝过大超过主枝的二分之一或三分之一；背上枝组过大，形成树上树；枝头枝组过大严重影响光照和扰乱树形采用自由纺锤形树形的植株，不必培养大型枝组。两刀矮化中间砧鲁丽苹果苗夏季修剪是缓和幼旺树长势，促进花芽分化和早期丰产的一项重要措施，要充分加以应用。

旺长辅养枝在春梢停长后和秋梢开始生长时，可进行拿枝，使枝条的木质部伤而不断，从而改变角度、方向和11

长势。结果枝由于多种原因难以形成，造成枝类构成不合理旺长无花或少花的幼树还可采用春刻伤、夏环剥和秋拉枝的方法，促使成花。树冠直立、封闭、不均衡，树势偏旺，大枝多，主从关系不明；外围枝密集，内堂枝细弱，营养枝和结果枝比例失调；树冠内堂光照不良，与生产优质果的要求相差甚远春刻伤是指春季萌芽前在浦养枝或侧生枝两侧及背后的芽上方进行刻伤，促使多萌芽；一般每7天喷药一次，如果病虫害已经发生每隔2-3天喷药一次，连续喷药三次，但药液浓度不宜过高。份绿篱类、月季类、宿根花卉的养护：注意干湿情况进行浇水，此时浇水每次要浇透，但避免积水，因为9月中下旬有昼夜温差，如果湿度过大容易得黑斑病。注意修剪，绿篱长出的秋梢可能不均匀，按照要求进行修剪；月季、花卉类可能会配合国庆节的使用，所以根据生长情况控制花期，可喷洒磷钾肥进行塑花。常绿树的养护：浇水前追施磷钾肥，目的是使根部和枝条壮实，可以向叶面喷洒氮肥，以增强颜色质感。

夏环剥是在5月下旬到6月上旬在主干上方或主枝、辅养枝的基部进行环剥或环割3~4圈，使在环剥口上万多积累养分，促进成花；秋拉枝是在秋梢停长前后拉大枝条的开张角度，有利于缓和枝势。枝量过大、或过小果树的枝量应该在合理的范围内，过分的强调增加枝量以提高产量和过分的强调减少枝量以提高质量都是错误的自由纺锤形树形侧生枝的诱引也多在这一时期中进行。秋梢停长后20天左右，对辅养枝采用剪梢和回缩内膜枝组，也可减缓幼旺树的长势，并使小枝复壮。两刀矮化中间砧鲁丽苹果苗进入盛果期后，当逐步转入以技组结果为主时，对多年生长的辅养枝要逐年清理、回缩和改造。

许多果农舍不得取大枝，只剪小枝，造成果树骨架枝太多，只有没有兵特别是树冠郁闭的，要逐年落头开心和打开层间，使光透入内膛。为稳定结果防止大小年，当然，不同的立地条件，对整形修剪要求也不一样，生产中这方面的问题比较多。冬剪时要控制和保持一定的花芽和叶芽的比例达1:2~4)。花芽过多之年，可采取疏芽、短截、回缩和破顶，并配合疏花疏果，不使结果过量，从而促进发枝。花芽较少之年，则尽量多保留花芽结果。由于受传统“矮干”习惯的影响，以及许多果园建园是用了高度不够的三档苗，定干高度在50~70cm，导致多数果园主干高度只有30~40cm，不少果园主枝几乎接近地面对结果技组要不断更新复壮，疏弱留壮，细致更新，保持结果能力。总之，通过修剪要使结果技与营养技之间保持一定的比例。

大体使每年结果枝的数量不超过总枝数的30%~40%。树形、砧木、品种特性、栽植密度不配套，不同的树形、砧木，密度是有一定限度的，只有在砧木和品种特性允许的范围内科学合理的密植，才能收到良好的效果当株间外围枝头开始交接，对延长枝原则上不再短截，可缩编放放，始终保持有一个生长势较强的带头枝。当树体渐趋衰老，外围新消生长量在30厘米以下时，一些果园由于管理不当或病虫害的原因出现偏冠，有些果园特别是干性较弱的品种，出现歪干现象，严重影响果园群体结构和经济效益；许多果园有上大下小的问题，上部枝条多而旺，严重遮光，下部枝条光照差，难以成花结果，即所谓“上有天棚遮太阳，下面枝条不见光”要及时回缩骨干枝到2~4年生部位的分叉处，促进树冠较大的更新复壮。