

黑桃皇后3公分桃苗期施肥要点及用量

产品名称	黑桃皇后3公分桃苗期施肥要点及用量
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

黑桃的成干性较强，一般在整枝时，采用疏而截的办法对一般枝条进行整枝。桃树不同的物候期对肥料的需求，一般年施肥五次，以重施基肥、巧施追肥为原则，把握生产无公害鲜桃肥料使用准则，根据品种、树势、结果量、土壤肥力等因素，合理选择肥料种类和用肥量，生产出既丰产优质，又安全的鲜桃。在主干上一般不留侧枝。定植黑桃树苗当年不整枝，促使当年树苗多发新枝，当新枝梢长至60公分时进行摘心。

行株距1.8米×0.6米，顺南北行向挖定植播种沟，施足底肥，占全年施肥量的60~70%。施肥量应针对树龄、树势、产量掌握，一般株产100千克左右的桃树，施基肥100~150千克，少要求“斤果斤肥”。按定植株间距播种。基肥深施，施用有机肥2.5吨/亩、复合肥50千克/亩，混合后撒施于定植沟，然后浇水。嫩枝扦插时，插穗采集后按品种分等级包装，每50条或100条为1捆，立即扦插。一般在升温前施入，以补充树体贮藏养分的不足，为萌芽开花作物质准备，以氮肥为主适量配合磷肥。宜施入人畜尿混掺适量尿素。若生长势旺，基肥足可以少施或不施。当场未使用完的插穗可用保鲜膜覆盖保湿，摊放于室内阴凉背阴处，经常洒水以保持大湿度，可短期贮藏数日。硬枝扦插所用的休眠枝，可用湿河沙贮藏(含水量保持在60%为好)或者对插穗进行蜡封处理以保存越冬。

黑桃皇后源于北美洲，在我国南北方地区都可以种植，适应范围极其广泛。以采果后9~10月为好，因9月份以后桃树根系进入第二次生长高峰，施肥可促进伤口的愈合，促发新根吸收养分，对提高花芽质量有明显的效果。这类桃子不仅适应环境的能力强，抗寒、旱、涝、病虫害能力也是相当强大。黑桃果实5-6月生长缓慢，7月份为膨果期，7月底成熟。外形如普通桃，果型较大。一般单果重120-160克，大单果重达245克。