

西梅李子树苗基地价格，西梅李子树苗批发及单价

产品名称	西梅李子树苗基地价格，西梅李子树苗批发及单价
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	4.50/棵
规格参数	品种:嫁接李子树苗 规格:一公分 高度:150
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

该虫为鳞翅目小卷叶蛾科害虫，是危害李子果实严重的害虫，常常被害率达80%—90%。在虫孔处流出泪珠状果胶，被害果实不能继续发育，渐渐变成紫红色而脱落。被害果虫道内积满了红色虫粪，老乡称"豆沙馅"。

防治方法：李子食心虫防治的关键时期是各代成虫盛期和产卵盛期及代老熟幼虫入土期。采用90%敌百虫0.8%液、50%马

拉硫磷1%液、50%敌敌畏0.8%液。李树生理落果前、冠下土壤普施1次50%辛硫磷1%—1.5%液。在落花末期(95%落花)小果有麦

粒大小时，喷第1次药，用敌敌畏、敌杀死、速灭杀丁、来福灵均可，每隔7—10d喷1次。从综合防治的角度考虑，可用生物制剂进行树冠下土壤处理，如白僵菌等。秋后应把落果扫尽，减少来年虫源。

李树在栽植7年以后即可进入丰产期。此期冬剪的主要任务是限度地提高单位面积产量，严格控制大小年及后部光秃带的形成。冬剪原则

重剪为主，轻重结合，以保持生长和结果的平衡，整形结果并重转入以结果为主。冬剪方法 各级主、侧枝延长枝进行1/2短截，对其上着生的花束状果枝，短果枝适当疏剪，以免削弱树势；对主枝头下垂，株行间相接等情况可适当回缩主、侧枝。对结果枝组应转入以花束状果枝群为主结果，应占90%以上，注意在2~3年生枝上培养，要及早培养，过晚则枝条光秃，很难培养。对衰弱的结果枝组更新复壮是保证克服大小年及光秃带的关键，主要技术是“一截二放三缩”和去弱留强、去边留中、去下留上的方法，即对各级主、侧枝延长进行1/3短截，对第二、三侧枝截留1/2；对徒长枝、密生枝、重叠枝、交叉枝注意疏除和及早培养；对上年开花结果的枝进行回缩；对发育枝和少花枝适当进行“先截后放”和“先放后截”，培养中型结果枝组。李子的三早栽培技术措施：

一、合理修建促进早期花芽形成：李定植当年，新梢长到30厘米左右时进行摘心控制，促发副梢并形成花芽。如在密思李、大石中生、大石早生上通过摘心后，有40%的副梢能形花芽，而夏季不在心的李树

，当年一般不形成花芽。年冬剪时，对当年生枝一般缓放不剪，对于密挤枝，徒长枝、遮光枝采用疏出的办法处理。这样，在当年缓枝上则能形成大量从状花芽。第三年冬剪时，对缓放过的枝进行适当回缩，避免树枝衰弱。以后各年冬剪时，则依次采用缓琐事修剪。

二、合理施肥促进花芽分化和果实早熟着色

色：施肥要注意各种肥料

的配合，特别注意在

秋季落叶前施足有积肥。第二年李果成熟

前要施用适量的磷、钾肥。以促进花芽分化和果实着色。氮肥

对李果的成熟早晚有较大影响，因此，在李果采收前要控制氮肥的施用量。这样，可以提前李果的成熟期从而提高其商品价值。

三、防止春季低温提高座果率：李在花期常受低温伤害而影响座果。为此，可在春季芽萌动前灌水，以降低地温，延缓萌芽，推迟花期。夏季修剪多摘心、短截、促发副梢，利用副梢比主梢花期7至10天的特性来延迟开花。秋季9月中、下旬每株可喷布100毫克乙烯利，也可延迟翌年花期3至5天。利用以上措施，避免早春低温对花的为害，从而提高座果率。