

油蟠桃系列桃树苗购买价格，油蟠桃系列桃树苗批发及单价

产品名称	油蟠桃系列桃树苗购买价格，油蟠桃系列桃树苗批发及单价
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	3.50/棵
规格参数	品种:品种桃树苗 产地:山东 规格:一公分
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

每当夏季到来，最让人期待的水果?就是西瓜和水蜜桃

，大家对于桃子已经非常熟悉了，桃子有很多品种，大致有毛桃、油桃、黄桃3种，不过，还有一种黑色的桃子在市场上很少见，这就是“黑桃皇后”。这种桃子看上去乌黑发紫，但是却有非常浓郁的甜味，吃一口可以说是终身难忘。

黑桃皇后多少钱一斤？

黑桃皇后一般在9月份成熟，普通的桃子差不多是在7、8月份成熟，黑桃皇后属于晚熟的品种，所以在上市时间有一定的优势。另外，黑桃皇后在口感有独特的优势，它的口感绵密甜润又多汁，营养成分也比普通的桃子要高很多，维C的含量惊人，再加上这个品种比较少见，所以其价格自然也就高很多。现在黑桃皇后的价格差不多在20元-40元/斤，有些地方甚至买到60元一斤。这么贵的桃子如果大面积种植产值也是很不错的。

黑桃皇后种植技术

1.土壤选择

虽然黑桃对土壤没有很严格的要求，但是要种出高质量的黑桃皇后，首先土地的质量要好，这就要求果农们在土地上下足功夫。黑桃皇后喜欢温暖的环境，土壤要选择疏松肥沃、排灌良好的土壤。要记住土壤和种植环境选的好，才能够种出好果子。

2.定植密度

果树定植的密度按照行距3m株距2m进行挖定植坑，定植坑上口宽80cm，深60cm，底部直径40cm。在定植时要施入底肥，用腐熟的有机肥比较好，每棵树都要用。土壤与肥料要充分混合，在种植时施入树穴。黑桃皇后定植不可过深，过深会闷根，不利于成活。定植完成后浇足定植水，一亩地的果树苗在110棵左右。

3.树形塑造

进入果期的黑桃皇后需要对其树形进行塑造，一般主干上不要留侧枝。新树苗要促使其多发新枝，枝条

长到60cm左右时要进行摘心，去除顶端的优势，时花芽更好的分化。黑桃皇后的生长力比较强，花果期要着重进行修剪，合理进行疏花。

4.田间管理

黑桃皇后在生长期需要充足的水肥，要保持土壤有一定的湿度，夏季干旱时要及时浇水，雨季要注意排水。黑桃皇后从花期前就要开始施肥，前期以氮肥为主，促使萌芽和生长，果期要配合使用氮磷钾肥，还有腐熟的有机肥。

4.修剪

黑桃皇后在春夏季节要进行合理的修剪，促使其花芽分化，提高坐果率。夏季修剪可调整其枝叶的密度和分布，使每一颗果实都能够接受阳光照射，这样有利于果实膨大，使果实集聚更多的养分，发育更好，着色也更好。冬季的修剪主要是清除病虫枝和残弱枝，是树体的骨干枝条更新换代，提高果树的抵抗力。

好了，关于黑桃皇后这个品种，我们今天就讲到这里。黑桃皇后是一个优良的桃树品种，它的适应性很强，管理技术也比没那么难。一般盛果期的黑桃皇后每亩地在两千公斤以上，产量不错，黑桃品种在市场上的价格比较高，所以大量种植的话收益也非常可观。

最近有许多果农朋友私信说今年栽植的桃树，如何管理才能做到第二年挂果，第三年有收益呢？对于这个问题并不是做不到，而是涉及多方面因

素，只有综合管理的条件下才能实现第二年挂果，第三年有收益。由于桃树属于纯花芽，当年枝条就可以形成花芽，因此第二年挂果是完全可以做到的，但是实际生产中许多果农却没有做到一年栽植，二年挂果，三年丰产的目标，这是为什么呢？我们认为主要有以下几个原因造成的。

1、栽植时间不合适

2、管理技术不到位

3、当年没有形成花芽

下面我们具体分析这3个原因，希望对今年刚发展栽植桃树的果农朋友有实际指导作用，因为现在开始管理到位明年挂果是大概率事件。

一、栽植时间是否适宜

许多人认为春天是栽植果树苗木的最佳季节，事实上并非如此。除了北方部分寒冷地区以外，我国大部分地区种植果树苗木的最佳季节是苗木落叶之后，也就是秋末冬初，这个季节栽植苗木的地上部分已经停长，营养已经回流，苗木进入根系生长的阶段，也就是秋季栽植先长根，春天发芽，而且苗木成活率要比春天高很多，春天栽植极易出现苗木“假活”问题，因为是先发芽后长根，根系尚未恢复吸收养分的能力，而发芽都是树体贮存的养分，一旦消耗完而根系又不能吸收养分，最终还是会死苗。苗木不成活，一切都是零，因此保证苗木成活时所有问题的基础。

保证苗木成活率水和温度是最基本的要素。特别是春季栽植桃树，气温高，蒸发量大，因此必须保证土

壤墒情良好，由于桃树根系较浅，保证20到30公分含水量在50%以上就可以满足根系伤口愈合组织的恢复，只要桃树根系恢复从土壤中吸收水肥的能力，基本上可以确认已经成活。

对于南方大部分地区建议果农朋友有条件的在秋后栽植，这样栽植桃树根系已经恢复正常吸收水肥能力，来年可以尽早发芽，进入正常的生长，树势强，长势旺，有利于我们后期提早进行管理，形成有效的结果枝组。

对于春季栽植的桃树，南方地区尽量在植树节以前栽植完毕，北方地区可以适当延后，同时为了加快桃树根系迅速恢复正常生长，栽植时尽量选择粗壮根系发达的种苗，同时用生物菌肥及生根剂蘸根，栽植后浇透水可以用地膜覆盖，即可以提高地温还可以预防杂草提高抗旱能力。

二、后期管理技术

“庄稼一枝花，全靠肥当家”，对于刚栽植的桃树来说也是如此，这阶段主要是为了迅速加快桃树长叶长枝的能力，因此氮肥是首选。在这里建议果农朋友使用氨基酸水溶肥，水溶肥虽然肥效时间短，但是不需要转化可以迅速供给桃树根系吸收，从而达到长树增叶的目的。但是需要注意的是由于此时桃树根系较弱，吸收能力不强，建议果农朋友不要一次性用太多，少量多次是最佳的选择，随水冲施是最佳的方法。

四、桃树花芽的形成条件

桃树进入6月上旬后，地上部分进入停止期，根系进入当年的生长高峰期，花芽进入生理分化高峰期，营养生长开始向生殖生长转换，桃树制造的营养由果实向花芽外运送，此时果树对磷钾元素的吸收进入高峰期，如果春季氮肥使用过多，桃树营养生长旺盛，这样生殖生长就弱，自然花芽分化就不好。因此对于刚栽植的桃树前期可以多施氮肥，但是建议还是要以均衡的复合肥，生物有机肥

为主，对于使用最广的尿素还是尽量少用，不然会造成春梢不停长，难以形成花芽，没有花芽自然第二年肯定不会结果，这是很自然的事情。

建议前期以氮肥为主，进入6月份后进入花芽分化期后，以磷钾元素为主，这样的目的就是为了让桃树枝条生长减缓，营养生长转换成生殖生长，而磷钾元素可以促进桃树花芽分化，促进枝条木质化，形成明年的结果枝。同时为了避免营养被秋梢利用，可以采用摘心，扭梢等措施减缓营养的输送。

同时后期为了避免桃树营养生长过强，要注意控制浇水，避免秋梢生长过旺，不利于枝条的木质化。同时也可以采用叶面喷施PBO调控或者喷施0.3%磷酸二氢钾促进枝条木质化，提高冬季抗寒能力，避免发生冻伤。

综上所述，要想做到桃树第一年栽植，第二年挂果，第三年丰产的目的，最重要的就是第一年管理过程中创造桃树形成花芽分化的条件，只要第一年有花芽，第二年挂果就是水到渠成的事情。果农朋友，现在管理还不晚，没做到位的赶紧行动吧！#谷丰计划#