

油蟠桃系列桃树苗市场价格，油蟠桃系列桃树苗销售及培育基地

产品名称	油蟠桃系列桃树苗市场价格，油蟠桃系列桃树苗销售及培育基地
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	3.50/棵
规格参数	品种:品种桃树苗 产地:山东 规格:一公分
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

桃树主干形栽培由于具有结果早、产量高、品质优、效益高、管理技术简单、便于机械化操作等优点而受到广大果农的欢迎。

桃主干形基地

在新建桃

园中各地不少开始采用这种先进的栽培模式，一些果农基本掌握了这一技术。然而，还有相当一部分果农还是没有领会主干形栽培技术的实质，在实际生产当中难以灵活运用；一些果农虽然基本掌握了主干形的培养技术，无论从新建园的树形建造还是老果园的主干形改造，都做的有模有样，但是，对于树形建成后的管理，枝条选留，枝条的更新，树形的动态管理等问题不是很清楚；有一些果农，虽然按照主干形来管理，但思想观念上还没有摆脱过去三大主枝开心形及管理方法的束缚，实际操作中出现了这样那样的问题。针对目前桃主干形生产现状，有以下几方面的问题值得我们思考和注意。

1 主干整形问题

1.1 主干管理不当

主干直立优势差，东倒西歪，严重影响树体通风透光和结果。

主干上强东倒西歪

栽植成苗时，嫁接口以上留10~15cm短截，发芽后待新梢待长至20 cm以上时，选留直立旺盛的作为主干，用竹竿绑缚，扶正新梢防止被风吹折，并随着苗木长高不断绑缚，其余新梢要扭稍使其下垂或者进行摘心。

扭稍

要想彻底解决主干歪斜问题最好是设立支架，每个6-8米设立一水泥柱，柱高3米，离地面60厘米开始设立3道铁丝。

1.2 栽植当年要合理处理新梢

建园当年，不少果农习惯抹去新梢较多，这样做一方面不利于根系的生长，另一方面容易导致所留新梢生长过旺，长成粗大的侧枝，不利于培养细长的果枝。

春天从成苗上发出的新梢，除基部萌蘖及时抹除外，其余全部保留并扭其下垂，且越多越好，以分散营养，并促进根系生长；过低的基部新梢可于7月份以后逐步疏除。处理时要保持主干的优势。

上传中对于新梢要进行摘心处理。

指导果农进行摘心

1.3 上强下弱问题

生产中发现，采用主干形进行整形的桃树，有上强下弱现象，这主要是由于直立的树形加剧了上部的顶端优势，加上在管理上不注意控制树体上强，或对顶端的强势新梢控制不及时或不到位，及顶部留果枝过大，留果量过小等造成。

出现上强问题

对出现上强下弱的情况可以采取一些措施技术纠正：

一是冬剪时顶部留细弱果枝，下部留较壮的果枝作为牵制枝或当年夏季就有意识的培养好牵制枝条；

二是疏果时上部适当多留果，下部适当少留果；

三是注意加强顶端新梢的控制，可采取扭梢的措施或化控，对当年新梢及时扭梢使其水平或略下垂，进入盛果期后及时控制果枝上的新梢，防止其旺长；对较粗果枝拉枝使其下垂，抑制顶端优势，防止果枝前部冒条，促进其基部发枝；冬剪时疏除过大枝组或在夏季就采取摘心等措施防止主干上竞争枝出现，枝干比控制在5~6:1。

指导果农进行纠正修剪后的情况

2修剪技术易出现的问题

2.1扭梢问题

扭梢不及时、扭梢不当造成新梢旺长，扰乱树形和影响树体通风透光，或造成大量新梢扭断干枯死亡。

扭梢通过这几年应用来看果农掌握不好，往年扭梢过重导致流胶等问题发生，应该采用捋枝拿枝的方法，从新梢基部逐步向外拿捏，使新梢呈略下垂即可。有时捋枝后，部分新梢还会出现恢复原位的现象，就需要进行二次捋枝，捋枝拿枝一般只是在幼树培养树形中用到，进入结果期后可以不在应用以减少劳

动用工。

捋枝拿枝后的情况

培育过程中可以应用摘心技术。摘心是在新梢旺长期，摘除新梢嫩尖部分。摘心可以削除顶端优势，促进其他枝梢的生长；经控制，还能使摘心的梢发生分枝，以削弱枝梢的生长势，增加中、短枝数量。

当年栽植定干后摘心

对于生长的幼树主干发的侧枝进行摘心

2.2新梢控制不及时

新梢控制不及时会导致全树新梢旺长，造成满树大枝、新梢粗壮、树冠交接、通风透光恶化、花芽形成困难、中晚熟品种果实后期脱落、果实品质降低等，甚至导致栽培的失败。

这是任其生长的后果

第1年，当新梢40~50 cm时及时捋枝拿枝，个别强旺新梢要留2~3片叶（10厘米左右）重摘心；树高达1.8~2.0m、全树有30个左右优质新梢时应即时喷多效唑150倍控制。

第2年，果枝上的新梢长度达30~40 cm时，要喷施1遍150倍的PBO或150倍的多效唑；对果枝背上发出的过旺的直立新梢，可将其疏除；对严重影响光照的新梢适当疏除。从继续向上生长的中干上发出的副梢，可按栽植当年树上新梢进行管理。在秋季，在中干顶端，留1~2个粗壮的新梢(增粗枝)任其迅速生长并加粗，从而使主干迅速加粗，但要防止影响下部光照。第3年以后，当新梢长到20~30 cm时，及时喷多效唑控制，对个别强旺新梢重摘心。

指导捋枝情况

2.3 夏季修剪去枝过多

有些果农，在早熟品种采收后，对结过果的树进行大砍大杀，造成根系大量死亡，从而导致叶片大量发黄，若又遇到雨季土壤长期高湿，会引起树叶发白、落叶，严重削弱树势；修剪较重的，对所留新梢造成二次副梢象鱼刺一样一排排发生，严重影响花芽的形成。

为了解决夏季生长过旺桃园容易出现郁闭的情况，可以在每年9月下旬进行一次秋季修剪，这个时期修剪一是桃树不再发芽，打通光照后对于花芽的后继分化非常有利。

进行秋季修剪培训的场景

冬剪时留果枝要适量，促进新梢发生；在疏枝时要注意基部留芽；坐果后适当疏果，疏除一部分坐果少的果枝；早熟品种采收后，对已快郁闭的树，采果后对过大过密的果枝疏除一部分，适当回缩一部分，尽量保留比较细弱的果枝，以备冬剪时救急用。注意不同品种间的差异，早中熟品种采果后要适当修剪，但也要防止修剪过重。避免对新梢进行推平头式重短截。

冬季对1年生幼树进行修剪的情况

2.4 盲目短截果枝

果农冬剪时按照常规树形桃的短截修剪法，对保留的果枝进行枝枝短截。造成果枝上的优质花芽被剪掉

， 树体旺长， 结果外移， 树冠扩大， 果园郁闭。

进行短截修剪的树

主干形要求冬季修剪要采用长梢修剪法， 对所留果枝全部长放； 已经采用短截修剪的， 夏季在加强树体控制的同时， 加强树体的夏季修剪， 培养好围绕主干及果枝基部发出的新梢， 为冬剪留果枝打下基础。

长梢修剪结果状

3花果管理不当

3.1 不及时疏果

主干形桃树由于采用长梢修剪法，果树上留花量较大，对白花结实的品种、授粉树配置比较合理或搞人工授粉的果园，坐果量较大，有的每个果枝坐果多达20多个。这样，不进行人工疏果就会造成产量高而果个小、效益低的局面。

这就要求：一是冬剪时留果枝适量，一般每树留30-35果枝就可；二是坐果后及时疏果，按平均每个果枝留1斤果的原则进行留果，即大果型品种每个果枝留1-2个果，中果型品种留2~3个果，小果型品种留3-4个果；三是加强果园的肥水管理；四是注意树体的夏季控制，调节好结果和新梢生长的矛盾

疏果后的情况

4植物生长调节剂控制树势存在的问题

生产中由于化控不及时，经常出现栽植第1年或进入结果期树旺长情况，造成幼树难以成花，大树主干上长满大枝，树行郁闭。或者由于多效唑使用过多，造成树体难以抽出新梢或新梢很短。

栽植第1年，当树高1.8 m以上，主干上有20个以上优质新梢后，在捋枝的基础上，应及时喷多效唑控制，特别是一些幼树不易成花的品种，更应早喷、多喷，以控制其旺长，促进成花，保证第2年结果，喷药的时间一般在6月下旬到7月上旬，控制效果不好要连喷2次，这是针对前期肥水管理好的情况下采取的措施，管理不好树体生长不好的要延迟喷药。进入盛果期后，在新梢长到40-50 cm时，就应及时叶面喷多效唑或PBO，浓度掌握在150倍，根据树体强旺程度确定喷施次数，一般2~3次即可。禁止土施，否则会造成中干培养困难。

5土肥水管理方面存在的问题

由于忽视前半年管理，对树体未能很好地控制以及任意间作和不当的肥水管理，造成树势过旺或过弱，难以成花。

重视4~6月份的管理工作，新梢长到10cm时，开始追第1遍肥，以尿素为主，以后每隔15天追1次肥，追肥后及时灌水，然后每隔7~10天叶面追肥1次，叶面肥
建
议采
用400倍
聚肽蛋白液，双
管齐下促进树体旺长。到6~7月
份进行化控，地下叶面同时追施以磷、钾肥为主的肥料，促进形成花芽。

桃树是目前种植比较多的果树之一，桃树的品种也非常丰富，每年都会有一些新的桃树品种推出，这虽然增加了果农的选择面，当然同样也增加了果农的选择难度。应该如何选择桃树品种其实和选择种子很类似，都需要考虑因地制宜的问题。这里科学兴农就和大家分享一些关于桃树品种和如何选择的问题。

什么样的桃树品种好？

目前市场上的桃树品种还是非常多的，桃树品种主要有五个主要的品种群，分别是北方桃品种群、南方桃品种群、黄肉桃品种群、盘桃品种群、有桃品种群这五个品种群，目前油桃应该说是一个被重点栽培的桃树品种群。

想要知道什么样的桃树属于优良品种的话，首先需要清除优良桃树品种具有的特点有哪些。优良的桃树首先在综合性状方面需要保持优良的特性，也就是说无论是果树的内在还是外在都非常的优秀，比如果树的抗性非常好，结果时间早，果实品质好等都是优良果树应该具有的特点。并且作为优良桃树品种还需要具有比普通果树的优点突出的特性，比如果实的成熟时间短，并且果实品质好，耐储存等都属于一个优良果树应该具备的特点。另外就是作为优良桃树品种的话必须保障没有明显的缺陷才可以。

桃树有哪些新品种？

桃树的新品种每年都有很多，在这里个人认为选择适合当地环境的桃树才是最重要的。今年市场上比较多的几种桃树的新品种主要有：五月红桃、果农十号桃、中都冬桃、皖农一号桃、宝凤蟠桃、黄金油蟠桃、黑桃、春蜜桃、中华桃王、极早蜜、贵妃血桃、炎陵黄桃、映霜红桃等品种。

下面就主要介绍这其中的几种桃树的特点。

首先是五月红桃这个品种，五月红桃属于成熟时间较早的毛桃品种，每年的五月下旬就能够进入上市时期，并且果个非常大，耐储存，而且丰产性好，非常受种植户欢迎。

宝凤蟠桃：宝凤蟠桃的成熟时间较晚一般在每年的7月份才成熟，不过桃子的外形非常好看，果肉为黄色，耐储存，非常适合种植。

贵妃血桃，从名字上就能够看出来贵妃血桃果肉属于红肉的桃子，贵妃血桃的属于血桃品种当中非常优良的品种之一，口感甘甜，并且国色独特。

黑皇后油桃，这种油桃品种目前还在推广之中，属于成熟时间比较晚的油桃品种中，一般在每年的8月份左右才进入成熟期，具有果形美观，口感佳，果肉厚实等特点。