

新品种桃树苗购买价格，新品种桃树苗基地及销售

产品名称	新品种桃树苗购买价格，新品种桃树苗基地及销售
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	3.50/棵
规格参数	品种:品种桃树苗 产地:山东 规格:一公分
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

带木质部芽接法在生产上用得较多，它的优点是一年四季均可嫁接，不受枝条是否离皮的限制，并因芽片带木质部不损伤芽片内的维管束而嫁接成活率高，苗木生长势强。

削接穗 要选择粗细适中、芽眼充实饱满的接穗。用锋利的小刀从接穗芽的上方1~2厘米处向下斜削一刀，深达木质部，再从芽的下方1厘米处约成45度角斜切一刀，取下带木质部的芽片。芽片要求长一些，以便增大与砧枝切口的接触面，一般以2~3厘米为宜，厚度为接穗直径的1/4至1/5。

切砧枝 用同样的方法在砧枝的光滑部位切一个与芽片基本相同或稍长的切口。

砧穗对接 将芽片插贴于砧枝切口上，插入芽片后应使芽片上端露出一线宽窄的砧枝皮层，形成层一定要对齐。

绑缚砧穗 用塑料条将砧穗接合部绑紧，注意芽一定要露在塑料条的外面。一般情况下，嫁接后20天即可解下塑料条。

1.苗木与品种的选择

自己栽植苗木为以当地毛桃

为砧木的半成苗(即芽苗),苗木粗壮,根系完整,接芽饱满。芽苗很难辨认品种,栽植芽苗时最好自育自栽,确保品种和砧木的纯度。品种宜选择早果性强,适销对路的甜桃王、安农水蜜、曙光、早红珠等早、中熟品种。2.整形修剪

树形仍沿用传统的自然开心形,干高35 - 50cm,全树有主枝3 - 4个,成形后每个主枝上具有8 - 10个单轴延伸的结果枝组。定植后及时抹去砧木上的萌芽。接芽萌发后及时去掉苗木30cm以下的副梢,待新梢长至40cm时,插秆绑缚以防风折。苗高达60cm时摘去顶心,促进副梢生长,在副枝中选择方位适宜的3-4个梢培养主枝。定植芽苗进入6月后生长较快,应充分利用2、3次梢培养结果枝组。背上枝,直立枝要及时进行扭梢或捋枝,注意培养主枝两侧的结果枝组,使之错落排列,单轴延伸,合理利用空间。副梢摘心后再次萌发的三次副梢,长度达20cm时可摘心。幼龄桃树的修剪,特别是1~2年生时应常年进行,旺长阶段修剪更要及时。一般来讲,春季主要是疏枝抹芽;夏季主要是摘心、扭梢、捋枝、改造徒长枝,开张主枝角度,注意改变枝条的角度和方向;秋季重点是疏除过密枝、徒长枝以改善光照,促进花芽形成;冬季则重点对延长枝、长果枝进行轻短截、疏除过密枝、细弱枝、病虫枝,注重调整结果枝组布局。随着产量的增加,树势的稳定、冬季修剪量也应逐年加大,以保持生长与结果的相对平衡。3.肥水管理

每年秋季结合深翻扩穴,株施土杂肥50 - 100kg,复合肥

1 - 2kg;过磷酸钙3~5kg与熟土拌匀后填入穴中,踏实并灌水。春季喷一次0.3%尿素+0.5%磷酸二氢钾,果实膨大和花芽分化期各喷一次0.5%的磷酸二氢钾,同时视土壤墒情及时浇水。4.病虫害防治

发芽前喷一次波美5度石硫合剂。对炭疽病、腐烂病、叶蛾、介壳虫芽都有较好的防治效果,4月中、下旬喷一次0.067%扫蛾净+0.05%蚰虫林防治蚜虫和叶螨,从果实膨大期至果实采收前15d每隔20d左右喷一次0.0125%溶液阿维菊或桃小立克净,连续

喷2 - 3遍,以防治梨小食心虫、桃蛀螟等。麦

收前一周和麦收后一周各一次0.125%溶液普菌特或多锰锌0.167%溶液。