

新品种桃树苗购买价格，新品种桃树苗批发及单价

产品名称	新品种桃树苗购买价格，新品种桃树苗批发及单价
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	3.50/棵
规格参数	品种:品种桃树苗 产地:山东 规格:一公分
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

桃

树流胶病是一种非浸染性病害。此病多从早春树液流动开始发病，常见于枝干分杈或伤口裂缝处，尤其雨后发生严重。

桃树流胶原因很多，主要由于霜害、冻伤及天牛

、吉丁虫和蜡象等害虫造成虫伤或机械伤，这些伤口如不能及时愈合则导致流胶。2001年，笔者指导在20多亩低幼龄桃园试用紫药水防治桃树流胶病，防效率95.2%，比对照的50%抗病威300倍液防效率高出11.7%。

具体方法是“春季桃树未开花之前，在桃树流胶株上用刮刀刮去桃胶块，随用医用紫药水涂抹受伤部位及伤口，每隔5天1次，连涂3次即可治愈。

笔者还试验得出，用3%甲酚·愈创木酚可溶性液剂1000倍与紫药水交替涂抹，防治效果达98.5%，果农们不妨一试。

设施桃树栽培的模式主要是日光温室，现在正是设施桃树开花前期-

开花期，此时的管理尤其重要，关系到以后产量和品质，现将其管理要点简介如下，以供参考。

一、温度控制 花前最高25℃、最低5℃；花期最高22℃、最低3℃。花期遇不良天气，可能出现霜冻时，应加温处理。花后——硬核期，最高25℃，最低10℃；硬核期最高28℃，最低15℃；着色期最高30℃，最低15℃。简易温室及塑料大棚桃着色期可去掉棚膜草帘，进行露地管理，通风透光，有利提高光合作用，提高果品内在、外观质量。

二、土肥水管理 花前肥于现蕾前15—20天，每株施尿素200—250克。谢花后当幼果黄豆粒大小时追第一次肥，追肥要加磷、钾肥，以减少早期落果。每株结果树施尿素150克，过磷酸钙200—250克，氯化钾250克或草木灰10—15公斤。随着果实膨大，需要增强养分的吸收，在核硬化期追第二次肥，用腐熟人畜粪尿配施速效磷、钾肥，或用复合肥效果更好。树冠大的桃树，应酌情增加施肥量。初着色期追第三次肥，每株施肥量200 - 300gN、P、K复合肥，要做到沟施、穴施，避免撒施。每次追肥后，要浇水一次，硬核期后，要浇小水，注意防止裂果。

三、疏花疏果 桃树开花多、坐果率高，但坐果太多会影响果实品质，降低商品价值，同时可导致树势衰弱，缩短寿命。应及时疏花疏果，且宜早不宜迟。先疏蕾和花，然后疏果1—3次。疏花时，每节留1—2朵花，不留果的枝条上的花疏去。在疏花二周后首次疏果，除去小果、畸形果、朝天果、病虫果、留枝条中的壮果。对坐果率高的桃树要疏两次，对坐果率低的桃树只要疏一次。最后一次定果应在核硬时进行。

四、农药喷施

花期多进行

放蜂和人工辅助授粉，

喷用化学制剂多会引发授粉不良、落花落果，

所以对一般蔬菜

、果树提倡花期不向花朵喷药喷肥。桃树在春季容易遭受炭疽病、蚜虫等病虫危害。防治桃树早期病虫害，应在桃树的花芽与叶芽未伸出桃树表皮前，用石硫合剂波尔多液各喷一次，两次药液不宜同时喷，应相隔5—7天进行。