

## 如皋紫桃3公分黑油桃苗期施肥要点及用量

产品名称	如皋紫桃3公分黑油桃苗期施肥要点及用量
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

### 产品详情

设施油桃栽植密度440~660/667m<sup>2</sup>，即株行距1.0m×1.0m或1.0m×1.5m。黄皮幼龄果园一年要松土多次，一般结合除草和间种作物进行。在夏、秋季，雨后要松土，以防止土壤板结。在根际周围松土深度以5-10厘米为好。定植前结合深翻整地，667m<sup>2</sup>施充分腐熟的有机肥3m<sup>3</sup>，三元复合肥20kg，然后作垄，垄高30~40cm，垄宽40~50cm。油桃苗定植于高垄上。

大棚油桃栽培，开始升温时不要太急，一般扣棚后至萌芽前的温度掌握在0至28摄氏度即可。在鸡心黄皮幼苗定植成活后，在主干高40-50厘米处摘心或短截定干，促进截口下的芽萌发。待主枝老熟后，在15-20厘米处进行摘心或短截，促进剪口下的芽萌发，再在各主枝上选留2-3条健壮的、分布合理的枝条培养成二级主枝，采用同样方法培养三级分枝、四级分枝。萌芽期温度为5至28摄氏度；开花期保持白天10至23摄氏度(一服不要超过25摄氏度)，夜间不低于7摄氏度；新梢速生至硬核期为5至25摄氏度；果实膨大期为10至25摄氏度；果实着色期为15至28摄氏度；采收期为17至30摄氏度。黑桃除含水、脂肪、粗纤维、维生素、无机盐外，还含有少量的蛋白质、钙、铁和胡萝卜素等，具有健胃助消化、降血压功效。

集中连片栽植，在土壤深厚，土质良好，肥水条件较好的地区，行株距应稍大些，一般在定植后第二年开始，在原植穴外围开环状沟，或在行间(株间)各挖一条条状沟，深40-50厘米，宽30厘米。分层施放草料、作物茎秆、垃圾和适量石灰等，每年轮换位置，在2-3年内，全园深翻改土一次以8×9—6×8m较为合适，每亩可栽9—13株；在土层较薄，土质及肥力较差的坡地、沙荒、盐碱地，株行距应小些，以5×6—6×7m为宜，每亩可栽16—22株；