

杏树苗种植灌水与整形

产品名称	杏树苗种植灌水与整形
公司名称	泰安市建岳农业科技有限公司
价格	2.00/颗
规格参数	品种:杏树苗 型号:1-3年 产地:泰安
公司地址	山东省泰安高新区北集坡办事处季家庄村（注册地址）
联系电话	0538--8912239 18562357999

产品详情

灌水与整形：在萌芽前进行一次透水，满足杏树开花及生长的需求，开花后以及果实膨大期，还需要一次透水浇灌，让坐果率以及果实质量，得到提高。其次就是整形，整形时需要顺应杏树的生长习性，采用自然圆头形进行稍微的人为调整，保证杏树生长更加符合它的生长习性。其次就是越冬保护，对杏树也相当重要，常用的方法就是涂白，根劲培土，包草等手段，防止低温对树皮造成过度伤害。

杏树苗可在春秋两季种植，选择深厚通风的砂壤土，挖一个长宽高都为80厘米的穴，放入树苗；填回时底部放入20-30厘米厚的秸秆或杂草落叶等；填至一半时将有机肥与土混合填入，填至距地面约30厘米时，将坑内踏实或浇水，将土压实再覆一层表土；生长期间可喷洒磷酸二氢钾与尿素，并保持土壤处于湿润的状态。

杏树高接春季用枝接，南方在4月上旬，北方在4月中下旬进行，此时气温、地温回升快，树液充分流动，嫁接成活率高，芽接主要用于补接。

杏树常用的树形有自然开心形和疏散分层形，具有主枝3~4个或6~8个，每一主枝配有2~3个副主枝或侧枝。嫁接时，对较粗的主枝在中下部保留1~2个副主枝或2~3个侧枝，其余枝条自基部疏除，高接砧枝的粗度主枝直径2~3厘米，侧枝1~2厘米，一般保留长8~10厘米截断嫁接，没有适宜分枝的主枝，可在枝干上直接嫁接。

嫁接的方法骨干枝上采用劈接、单芽切腹接、插皮接，无分枝的枝干采用腹接法。杏木质坚硬，枝接成活率比苹果、梨低，接穗发芽早，接穗宜早剪取，选冷凉处理于土或沙中，抑制其萌芽，使砧枝先于接穗萌芽而后嫁接，成活率高。枝接要掌握熟练技术，刀要快，切口要光、平、直，嫁接速度要快，绑得要紧。芽接时期以8月中下旬，如遇干旱，要在接前3~5天灌水一次或雨后4~5天芽接。芽接一般用“T

”字形剥皮芽接法。接后要用塑料条将接口包扎封好，对枝接的削面和伤口，用接蜡保护，并用15~20厘米的小塑料袋套上接穗封紧在接口处，达到保温保湿的作用。待芽长出2~3片幼叶时，把塑料袋撕破，让新梢长出。