

新梨七号树苗购买价格，新梨七号树苗销售及培育基地

产品名称	新梨七号树苗购买价格，新梨七号树苗销售及培育基地
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	5.00/棵
规格参数	品种:嫁接梨树苗 规格:一公分 基地:创隆园艺场
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

新梨七号树苗购买价格，新梨七号树苗销售及培育基地忌栽柏树

因为梨树的主要病害梨锈病、赤星病，危害梨树的新梢、叶柄、叶片、果柄和幼果，可导致果枝萎缩，果实变形、腐烂甚至落果，而柏树尤其是龙柏和桧柏，则是梨锈病菌的越冬场所。到了春暖季节，越冬病菌会随风吹回到梨树上继续繁衍并危害梨树。另外，柏树和葡萄园也不能共处，因为葡萄附近若栽柏树，易导致葡萄果实晚成熟。忌栽松树，因为松树的孢子在春、夏季随风飘到果园会严重危害果树，尤其是梨树受害最严重。松孢子可导致梨树叶、果发生黄斑并刺毛丛生，使果实变畸形，严重降低坐果率，降低产量和品质。因此，在栽有梨树的果园周围忌栽松树。忌栽刺槐、洋槐一是刺槐极易招引椿蛾、臭屁虫，为害桃、李、梨、苹果等果树。椿蛾主要靠吸取果树嫩枝、叶柄、叶片、花和果实中的汁液维持生命，常导致果树叶片干枯凋落，果实变形甚至不能食用。二是刺槐分泌出的鞣酸类物质对多种果树的生长有较强的抑制作用，尤其以梨、苹果受抑制较为严重，可导致果树大幅减产或根本不结果。三是刺槐上的落叶性炭疽病菌也能感染梨、苹果等果树，使之大量落叶。忌栽泡桐因为许多果树无论是幼树或成年果树，均易患紫纹羽病，果树患病后，叶片黄化、干枯，甚至整株死亡。而泡桐则是紫纹羽病菌的越冬场所。忌栽榆树尤其是柑橘、葡萄园附近忌栽榆树，因为榆树是柑橘星天牛、褐天牛喜食的树木。若栽植榆树，则会诱使天牛大量取食和繁衍，转而严重为害柑橘。此外，榆树根的分泌物对葡萄有很大危害，易造成葡萄减产甚至整株死亡。忌栽胡桃、核桃因为胡桃叶的分泌物胡桃醌经雨淋后，滴入土中对苹果根有危害，可抑制苹果的生长，所以苹果园周围不宜栽植胡桃。

增施肥料是梨

树高产优质的重要措施之一。但是，同样是施用肥料，产量却大不相同。究其原因，一是施肥时间不当；二是没有充分利用好温、光、水、养、气等生态条件；三是没有配方施肥。

为了充分提高梨树施肥的效应，根据各地梨农的经验，必须注意掌握以下要点。

一、根据梨树发根特点确定施用基肥时间。成年梨树一年中根系有两次生长高峰，第一次在5月下旬至6月上旬，此时主要为新根生长旺盛期。第二次发根高峰在9月下旬至11月上旬，大量的新根在此时形成。第二次发根高峰正是梨树施用基肥的最佳时段。把握得好，就能充分发挥肥效，过早或过晚施用基肥效果就会下降。

二、用好生态因素择优施肥。一是温度。土温过低，根系处于较低活性状态，吸收养分功能下降。土温过高，会加速根系衰败过程，吸养功能受到抑制。梨树根系正常的温度活动范围在6 - 24℃，此段温度范围则是有效施肥期。二是光照。光照不足，光合产物减少，根系生长发育不良，不单降低吸收能力，而且抗旱、抗寒、抗病能力也相应下降。因此，施用基肥宜于在光照充足时进行。三是水分。土壤湿度过小时，养分溶解不充分，过高的肥料浓度会使根系细胞发生反渗透作用。因此，施基肥时，一要在墒足时施用，二要施后以水调肥，促进肥料尽快分解。四是土壤耕作。梨树喜欢在通气良好、肥沃的土壤里生长，土壤质地较差的，施基肥一定要深翻深埋，精细整地，增强通透性能。只有各种生态因素相互配套，才能发挥基肥的最佳效果。

三、配方施足

基肥。一般产果的成年梨树

，每棵树施腐熟的土杂肥或者栏粪50公斤，配施磷肥1公斤，氮肥

0.2 - 0.5公斤，或精制高能有机复合肥0.5 - 2公斤。基肥的施用量要占全年肥料总量的60 - 70%。