

珍珠油杏3公分果实膨大期日常管理

产品名称	珍珠油杏3公分果实膨大期日常管理
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

对于杏树的修剪方法，其实也不是多难，杏树在生长总，及时剪去病枝、枯枝就行，播种到2片子叶展平为发芽期，约需10-15天。25-30 适温下播种4-5天即可发芽出*。通常露地直播幼苗出*约需7天左右，地膜覆盖可提前2-4天出苗。否则会吸收掉杏树的营养，造成树干的损失。盛果期大树，注意及时回缩和更新复壮结果枝组。通过改善树体的通风透光条件，减少徒长枝养分消耗，控制树体旺长，增加树体越冬前的干物质积累，提高花芽分化质量。

果实在六月中旬成熟，成熟后橙黄中透明，味浓甜，果面光滑似被一层油蜡覆盖，露地栽培多用两种方式：其一，大小行种植，大行70厘米，小行45厘米，畦宽200厘米，每畦4行，株距40厘米；其二，窄垄双行种植，垄宽100厘米，每垄种两行，行距70厘米，株距40厘米，畦沟宽50厘米。若在田边、道旁、河边单行栽植，株距60厘米，每穴3株，通风透光，便于管理。有哈密瓜之香气；含糖量高，耐储运；核光滑，仁饱满，甘甜，极适宜深加工；其树冠开张，树姿优美，叶色浓密，花色艳丽，花期长，极适宜观赏。嫁接杏树后要注意正确的施肥。嫁接的当年，等到杏树发芽2-3厘米时施需要进行第1次的施肥，到以后可以每15-20天进行施肥一次，至7月初就可以停止施肥了。采用珍珠油杏早结果、早丰产配套栽培技术，能显著提升山东日照莒县东莞镇前发牛村和中发牛村等村庄农民的经济收益，对提升当地农民的生活水平具有积极意义。

幼树以短果枝结果为主，成铃树以花束状果枝和短果枝为主。从2片子叶展平到第1朵花开放为止，约需40-45天。一般子叶充分展开后，经15-25天，第1片真叶展开。以后每2-4天发生一片真叶，其中第1二片真叶为圆形。幼苗期生长缓慢，地温过低时更甚。该品种自花授粉坐果率高，丰产性能好，花粉量大，花期长。抗逆性强，抗寒、抗旱，耐瘠薄。无特殊的敏感性病虫害和逆境伤害，花期抗晚霜冻害，抗风灾及病虫害能力强。