

## 西梅蓝莓3公分果实膨大期日常管理

产品名称	西梅蓝莓3公分果实膨大期日常管理
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

### 产品详情

8月下旬成熟,成熟后果皮蓝紫色,平均单果重60克,大果达110克。果肉黄绿色,离核,硬肉质,南红梨树体生长势较强,幼树直立生长,6年生树高在4米以上,萌芽率高,成枝力强,以短果枝结果为主,腋花芽较少。栽后第3~4年开始结果,6年生树株产20千克,7年生树株产26千克。果实较耐运。可溶性固形物含量16%,即可鲜食,又是加工的好材料。西梅果实营养丰富,富含维生素、矿物质、抗氧化剂及膳食纤维,不含脂肪和胆固醇,是现代人的健康佳品

西梅树可以自然授粉,但果实生理脱落严重,授粉不稳定。为了提高西梅的产量,必要的人工授粉是不可少的。定植后修好树盘,立即灌水,每株树大约灌30千克,1周后再补1次水,补水后整平树盘,覆盖黑色地膜。覆盖黑色地膜可迅速提高地温,保持土壤含水量,缩短缓苗时间,还可以抑制杂草生长。花蕾在花期采集,花粉采集,晴天早晨授粉。这样,授粉的成功率就会更高。一般可采用点授粉和涂片法。以及用棉布喷洒甚至打花粉。西梅种植期间尽量少使用除草剂,因为喷量较少,不起作用,喷量较大,会严重影响果树,南红梨幼树期采用纺锤形树形,盛果初期采用小冠疏层形树形,盛果期采用开心形树形。6—7月主枝拉成80~90°,在新梢停长前摘心,促进较快形成短果枝群。导致果树枯黄,枝叶萎缩,应采取人工除草的方法进行管理,有利于西梅健康生长。栽植时把李树苗垂直放在穴,把根全部展开,然后边填土边提动树干,使根系与土壤间没有空隙而紧密结合。

在果园中每隔20~30米挂1瓶,离地面高度为1.2~1.5米。瓶要靠近枝干,每天早晨清除白星金龟子死虫。春季苗木萌动前定植。将南红梨苗木在水中浸泡12小时左右,使苗木吸足水分。对苗木根系适当修剪,剪除根系毛茬、病根、伤根等,使根系露出白茬,促使剪口处发生新根。定植时用果树生根剂蘸根。以虫诱虫法在果园里,按每亩挂6~8个啤酒瓶的标准,把啤酒瓶挂在离地面1.5米左右高处,捉2个或3个活的白星金龟子成虫放入啤酒瓶中,就会引其他成虫飞到瓶中。