

# 1-3年蜂糖李3公分幼苗春季刻芽及拉枝管理

产品名称	1-3年蜂糖李3公分幼苗春季刻芽及拉枝管理
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

蜂糖李的单个果实个头较大,浇水施肥都应当灌溉足,满足蜂糖李生长所需。萌芽期、果实硬核期及迅速膨大期,要去除内袋后3~5

天摘叶,先摘除果枝基部的黄叶、贴果叶,而后再逐渐摘除影响光照的叶片。摘叶可分2~3次进行,间隔4天左右,一次摘叶不宜过多,以免发生日灼。结合摘叶,对阳面着色达到标准的果实及时转果,使整个果实均匀着色。保证充足的水分供应,肥料则在果期前和生长旺期稀释后追施。其余新梢通过摘心、拿枝、短截等方式来控制或削弱长势,早成花芽;重截或疏除徒长枝、竞争枝,拉平辅养枝,疏除过密枝,平衡树势,改善光照,促进花芽分化。

在土壤肥力比较好的地区可适当进行稀植,可采用株间距3m、行距5m,按照开心形进行整枝。花期授粉一般采用人工授粉或是花期放蜂,每棚放蜂1-2箱为宜。花蕾期和幼果期,喷1500倍'速乐圃';套袋只有在树势中庸偏旺、树体通风透光好、各项管理措施到位的果园实施才能取得益。套袋果园要严格疏花疏果、合理负载。选择优质果袋,于花后35~40天适时套袋,采前15~20天根据天气状况适时除袋。目前生产上使用的优质双层纸袋主要有:日本产的小林袋,北京的爱民袋,陕西的星\*袋,青岛的青和、佳田袋,泰安的富民袋甘谷的华达袋,质量好的是小林袋。套袋前的病虫害防治相当重要。新梢长25厘米时摘心;并根据长势可在谢花后15天喷布15%多效唑300倍液一次,控制新梢旺长,提高坐果率;蜂糖李子苗秋栽长根,春栽长芽,栽植时间要根据当地实际温度和果树生长习性而定。追施钾肥有利于进步果实质量;每个骨干枝延伸头只保存1枝恰当方向的一次或二次旺长新梢,其他疏除;

李子苗种植的话要是优质李子苗,首先能保证李子苗拥有较高的成活率,果实着色期在树冠投影外缘内侧,铺设反光膜,可以明显改善树冠下部光照,增加反射光,使树冠内膛、下部不易着色的果实,尤其是果实萼洼充分着色,可使全红果率增加21%。几乎能够做到不死苗或是死苗少;其次是可以更快的生长发育,长势茁壮,快速结果;提高产量,优质的李子苗接的过能比圃的果子大得多。

