

蜂糖李3公分果实膨大期日常管理

产品名称	蜂糖李3公分果实膨大期日常管理
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

蜂糖李的生长发育速度非常快,尤其是在生长旺期,长势特别旺,新枝蔓发病,一般出现在有损伤的地方。初感病时呈水渍状淡红色、边缘褐色的不规则病斑,其上长出密生灰白色小粒点,即病原菌的分生孢子器,严重时病部干枯呈灰白色形状不规则的大病斑,病部干枯,并与木质部分离,后期出现麻丝状纵裂,病部上端生长衰弱,病重者枯死,基部发生大量愈伤组织,使枝蔓上部叶片黄化或变红,直至枯死。除了对于生长地段以及土壤肥力营养以及产量有要求外,种植密度上需要拉大一点,保证蜂糖李能够在果期时让产量翻倍。

在山区、丘陵以及比较瘠薄的地区建议采用株间距4m、行间距3m,按照自然开心形进行整枝,也可按行距2m、株距3m进行密植,按照主干形整枝,从而达到早期增产。7月中旬,葡萄白腐病主要为害果穗,也为害新梢、叶片等。果穗发病,一般先在穗尖发病,小果梗或穗轴上发生浅黑色水渍状不规则的病斑,逐渐向果粒蔓延,果粒先在基部变为灰褐色软腐,随后全粒变褐腐烂,果皮上密生灰白色略突起的小粒点(即为分生孢子器),果梗干枯缢缩。严重时全穗腐烂,稍受震动时果粒容易脱落,有时病果失水干缩成为深褐色,并有明显棱角的僵果悬挂在枝蔓上。在摘心枝的基础上,选出3-4个性枝,拉成60°角,其余枝拉成80°,作为辅养枝。枝上的直立旺梢及时扭梢、捋枝控制,过密枝疏除。蜂糖李子产量高,平均单果重35.3克,大65.9克,果形指数0.89;果肉淡黄色,平均果肉厚26.45毫米,果肉细腻,清脆爽口,肉离核,食用价值高。

在其上方0.5到1厘米处捎带木质部向下削一刀成盾牌形取下,对准形成层用塑料膜固定好。葡萄生长季节中,经常检查并及时剪除病果、病穗、病梢,摘除病叶,集中深埋或烧毁;冬季彻底清扫落叶、枝蔓、病果,剪除病穗、病枝,集中烧毁,同时喷3波美度石硫合剂进行全面清园消毒,以减少病菌侵染源。切接的话在砧木的顶端平切一刀,中间切一刀;接穗两边枝两边削平整了,将其插至顶端削出来的接口内,再将其用塑料膜绑定好。