

早酥红梨3公分梨苗移栽前后施肥技巧

产品名称	早酥红梨3公分梨苗移栽前后施肥技巧
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

在对早酥红梨树进行灌水的工作，每年要为其浇水至少5次。在实际对其灌溉期间，苹果在临近成熟期，由于其自身重力的作用，大部分果实呈下垂状，萼洼朝下，难着色。解决这个问题的办法是树下铺设反光膜。利用滴灌、喷灌的方式，在树盘周边为其覆盖草和膜，以促使蓄水效果的形成。红香梨属于砂梨系，定植次年管理得当就可部分挂果，株产40kg。如大树高枝嫁接还更快进入丰产期，亩产可达万斤以上。

适合高密度栽植，每亩栽植111株。此树形可提早结果。干高50~60厘米，主干上大量分布主枝和结果枝组，主枝数目为5~7个。树形可采取双层开心形或纺锤形。双层开心形，主干分枝点高60—70厘米，4月上旬陆续展叶，叶肉组织开始分化，光合作用，逐渐加强;枝条离皮;4月中旬枝叶迅速伸长，叶片的栅状组织与海绵组织分化完毕，结果枝现蕾，花芽分化迅速，花器各部发育完成;4月下旬新梢枯顶，新梢停止伸长，叶片不再长大，叶片绿色加深，叶片长成。第1层留3—5个主枝，第2层留2—3个主枝，层间距为70厘米，不留侧枝，主枝上直接着生结果枝组，大中小枝组错开排列，树高在2.5米左右;20天左右就出苗了。等到小幼苗长到10厘米长的时候，每亩可施尿素70-80斤均匀的把肥料撒到树的周围，急时把水浇上。追肥的目地是培育出高、大、壮的粘木，才能有优良的梨树品种。

发芽前、落花后各追一次氮肥，6月中旬施复合肥，结合病虫害防治在生长季前期叶面喷0.3%尿素2~3次，按树冠投影面积在树盘铺设银灰色反光膜，铺反光膜前要平整*地，拣净地上杂物;铺后要经常打扫膜面，保持光洁，保持其反光能力。一般每667平方米(1亩)用膜400~500平方米。果实采收前1~2天将反光膜收起、洗净、晾干，翌年可重复使用。6月份以后喷0.2%磷酸二氢钾2-3次，以补充树体养分，增强树势。在9月下旬至十月上旬果面喷施67.5ml/L复销酚钠药剂，可加速早酥红梨果形指数变化速率，可提高早酥红梨外观指数、可溶性固形物的含量，从而提高果品出果率和果品商品价值。