

全红梨3公分果实膨大期日常管理

产品名称	全红梨3公分果实膨大期日常管理
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

在山东省聊城市，在4月上旬花芽萌动，叶芽萌动4月上旬至中旬，盛花期4月中旬，肥水管理一般分为四步走，生长肥、促花肥、壮果肥以及养护肥。然后就是修枝整形和人工授粉也是比较重要的。第三个阶段则是老年果树的管理，我们需要通过修枝整形以及松*、追肥等方式来延长黄桃树的使用年限，并且达到不减产的效果。果实成熟期在8月中旬嫩叶紫红，梨花粉红，枝红皮红，果实全红，从座果到生长期到成熟期始终保持着玫瑰般的红色。幼果时呈鲜红色，生长期呈粉红色，成熟期呈紫鲜红色。

萌芽前10天左右，吸收根开始活动。相继花芽、叶芽、新梢、叶片生长、开花、坐果，需要大量的营养，在定植之后进行浇水，保持*壤的湿度，半个后查看幼苗的成活情况，做到及时补苗。园间管理一般分为三个阶段，第1个阶段就是幼树期的管理，而幼树我们主要是为了促进幼树的生长，尽早的进入果期。我们首先就是要合理的定干、抹芽以及枝叶修剪，其次在幼树的整个生长期，采用勤施薄肥的方式进行施肥，以氮肥为主，促进幼树成长。此时追肥以氮为主，追肥量要大一些，追肥后灌水。全红型的红梨品种在西洋梨品种中有红茄梨、红巴梨、红考蜜思等，而我国东方梨系中全红型的品种“全红梨”是第1个，西洋红梨需经后熟才能食用，果实不耐贮运，货架期很短，果树产量低此期的修剪目的是为了恢复树势，复壮枝组，延长结果年限。对下垂的多年生枝进行回缩，回缩部位要选良好的背上枝

7月至9月上旬，两种虫害在全年各代中均发生数量大、危害烈。新梢直立生长，节间背侧紫红色，腹侧绿色带有紫红色晕。卷须长，有2~3个分杈。枝条暗褐色，着生稀疏绒毛。成龄叶片肥大，深绿色，叶背有绒毛。叶柄长，紫红色。植株生长旺盛，萌芽率75.6%，结果枝率68.5%，每个结果枝和每个新梢的平均花序数分别为2.2个和1.3个。此期易出现高温和持续干旱天气，如三害齐发，则极易使梨树进入强制休眠期。一是全红型，茄梨着色面为50%。二是含糖量比茄梨高，无酸味。三是比今梨早结果1年，四是稀有，独具特色，国内尚无规模栽培。