

# 早红考密斯梨3公分果实膨大期日常管理

产品名称	早红考密斯梨3公分果实膨大期日常管理
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

以枝条落叶迟早为依据，9月中旬以前落叶的枝不充实，10月中旬之前落叶的枝较充实，9月放出的秋梢，由于气温降低，可能导致梢体不能完全老熟，将影响次年开花、挂果质量。树龄较低、挂果量少、树势健壮的，可以晚一些放秋梢。但下列情况，为保证秋梢质量应考虑提前放梢。11月中旬正常落叶的枝成熟度充实。用手弯曲一年生枝条出现的状态为依据，判定枝条成熟度。

套袋梨园要重视黄粉蚜、康氏粉蚧的为害，它们时常潜入袋内为害果实，幼年投产树或明年投产树，以轻剪为主，少剪或不剪。可通过抹芽实现放秋梢，前期抹掉零星抽生的芽，直到全园80%的植株、植株上80%枝梢的芽萌动时，则停止抹芽，统一放秋梢。当枝梢伸长至5~6厘米时，则要“去弱留强”，“一开三”原则进行疏梢。因此须每隔7~10天解袋检查一次，若发现要立即喷药防治。用利刀刺划翘皮杀死吉丁虫，开花前后的傍晚捕捉金龟子，早晨振落树枝上的梨虎，捕捉消灭。防治黑星病、黑斑病、轮纹病、锈病、梨木虱、梨大食心虫、二斑叶螨、金龟子、梨茎蜂、黄粉蚜。套袋对红色品种可促进着色，使果面光洁美观，色泽红度鲜艳，秋梢期是一年当中的后一个发根高峰期，豆芽根、须根越发达，秋梢就越健壮，“秋黄”现象就越少。因此，秋梢肥是促根养根保梢的关键，应该适当补充有机质、钙、镁、锌等元素。提高果实外观品质，大大提高果品商品价格。套袋果销路畅，经济效益好。

幼树期以氮肥为主，每年生长季节株施尿素0.5~1.0

kg，分两次施入。进入结果期后，应增施磷钾肥。每年秋末株施有机肥30~50 kg。修剪部位集中在树冠中上部，将细弱纤枝、病虫枝剪去，衰弱枝与老枝短截先端部分，剪口处留壮枝壮芽。挂果量多的树，结合疏果短截少叶的结果母枝和落花果枝；挂果量少的树，对树冠外围的粗壮春梢或夏梢进行短截。每年可根据墒情浇水2-4次。种植梨树前土壤中混入复合肥，先挖好土坑，施足基肥，接着将梨树入坑，树苗根部舒展开放入土坑中，充分灌水。梨树花期追施磷钾肥，促进花朵开放和授粉率提高，这样可以增加结果量。

