

# 云南土鸡苗 昆明土鸡苗批发 昆明K9鸡苗 青脚麻鸡苗 铁脚麻鸡苗肉鸡苗价格

产品名称	云南土鸡苗 昆明土鸡苗批发 昆明K9鸡苗 青脚麻鸡苗 铁脚麻鸡苗肉鸡苗价格
公司名称	蒲江县寿安街道伟静鸿家禽经营部
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:4.3kg 贵阳:98(%)
公司地址	四川省成都市蒲江县寿安镇隆盛社区
联系电话	17369032651 13981811874

## 产品详情

在肉种鸡限饲过程中，往往在天限饲，第二天喂料后便会发现鸡只嗉囊硬实饱满、卧地不起、全身震颤，继而头颈无力、嘴贴地面、腿向后伸、粪便稀白，严重的会引起鸡只死亡。从表面看这种情况虽然直接损失不大，但其间接危害较大，能引起部分鸡只消化不良、增重缓慢，长期下来不仅造成均匀度下降，还会影响生产性能的发挥。

### 一 易发生饱食性休克的情况

一般肉种鸡在育雏后期(4~6周)，刚开始对鸡群进行限饲时容易发生；在育成前期(6~12周)为了提高均匀度，采用“四、三”或“五、二”限饲法后的个喂料日易发生，且发生的时间往往在喂料后1~2小时内；在育成后期(16周后)，由于性器官开始发育，限饲强度变低，采用“每日”或“六、一”限饲，每天的料量较多，发生饱食性休克的情况就很少。

采用机械喂料系统的鸡群，采食速度快，较易发生；在同一鸡舍中体型较大的鸡只抢到的料量较多易发生，体型较小的鸡只由于消化系统发育不良，也易发生；另外，限饲强度过大、天气炎热、免疫应激、密度过大、采用乳头式饮水系统等，凡是能影响到饮水量的情况，均易发生饱食性休克。

### 二 饱食性休克发生后的症状

鸡群在此之前表现状态良好，无异常情况，一般在鸡群采食后1~4个小时，多发生的是在1~2小时内，发生休克的鸡只往往表现：卧地不起、两翅下垂、张口摇头、两腿后伸，个别鸡只侧卧在地上，手摸嗉囊饱满发硬，部分鸡只浑身发抖，有的因病情严重会发生死亡。剖检可见：嗉囊坚实、充盈，肌胃、腺胃内料量很少，肠道空虚无物，其它重要脏器未见可观病变。

### 三 预防措施

## 1 变换限饲程序

一般在采用“四、三”或“五、二”限饲时易发生饱食性休克，这时应及时更换为限饲强度较弱的“六、一”或“每日”限饲法，并保证更换程序后的喂料量一定要准确，投喂时做到：快、准、匀，让饲料在短时间内均匀布满料槽，无漏料、溢料，这样鸡只能同时吃到等量的饲料，避免激烈抢料和采食过多的料量而发生饱食性休克。

## 2 保证饮水充足

首先保证水位充足，尤其是乳头式饮水器，至少每8只鸡有一个饮水乳头。水线压力的高低应随鸡舍温度的高低而变化以保证鸡群饮水的需要，而不至于漏水。每天仔细观察和调整水线的高度，3日龄上升至45度角，到育成期随着日龄的增长逐渐升高，使鸡脖与水线呈75°角，鸡能顺利、舒适地将水喝进去。其次，定期认真检查减压阀内的皮垫和弹簧，清洁减压阀内的水垢和污物，保证其正常工作。按时消毒、清洗饮水系统，去除水管内部的杂质、细菌、药物残留物及生物膜附着物，从而达到饮水畅通的目的。

## 3 观察鸡群采食情况

饲养人员在每次喂料后，应认真观察鸡群采食情况，如果发现饲喂不匀或争抢激烈的小群体，应及时匀料并驱赶开这些鸡只，减缓其争抢速度和保证采食到适宜的料量。在鸡群容易发生饱食性休克的各种情况下，应重点防护，来回在鸡舍内走动，一旦发生休克现象，及时将鸡只拿到通风良好的宽敞地带，切记不可强行给鸡只灌水或挤压嗉囊，否则会加速鸡只的死亡。加强对这些鸡只的护理工作，等它们能够站立后，让其饮些水后再放入鸡舍。

## 4 改善鸡舍环境、减少应激

加强环境管理，给鸡群提供舒适生长条件。首先保证温度适宜，夏季通过加强通风和结合使用湿帘，来降低舍内温度，冬季及时供暖并做好鸡舍的保温措施，这样使鸡群始终处于18~24℃的舒适条件下，避免了饮水量的浮动。育成期遮黑鸡舍，在阴雨天应打开舍内光照系统，让鸡只均能很好获取充足的饮水量。在养鸡过程中应提前做好计划，各项工作安排尽量井然有序，不要影响到鸡只的采食和饮水，减少应激的发生，避免由此给鸡群带来的饱食性休克的发生。