

# 贵州鸡苗销售中心 贵阳青脚麻鸡苗批发基地 遵义快大黑乌鸡苗价格 凯里土鸡苗

产品名称	贵州鸡苗销售中心 贵阳青脚麻鸡苗批发基地 遵义快大黑乌鸡苗价格 凯里土鸡苗
公司名称	蒲江县寿安街道伟静鸿家禽经营部
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:4.0 ( kg ) 贵阳:98 ( %
公司地址	四川省成都市蒲江县寿安镇隆盛社区
联系电话	17369032651 13981811874

## 产品详情

鸡群的均匀度是肉种鸡育成期一个很重要的标志，是影响肉种鸡生产性能的主要因素之一。根据肉种鸡育成期均匀度高低，可以预测鸡群开产整齐性、产蛋率、产蛋高峰期、蛋重均匀程度及鸡群存活率。为了提高肉种鸡的生产性能，从周开始就应该重视均匀度，打下一个扎实的基础，进而提高鸡群的整体效益。

### 一 创造良好的饲养环境

温度应均衡，昼夜温差不能太大，尽量不要超过3℃；湿度达到要求，特别是前3天的相对湿度要达到65%以上，避免雏鸡早期脱水；重视通风，确保空气质量，根据鸡龄确定通风量。早期的光照强度要足够，在育雏开始阶段，光照强度较低(小于20lx)，将降低雏鸡的采食量，同时光照时间减少过快，也将降低雏鸡的采食量和影响7日龄的体重。入舍时，光照强度为20~30lx，然后渐降，至29天大约为10lx，整个鸡舍的光照强度应均匀一致，舍内一旦开灯，所有的鸡只都应同时得到饮水和饲料。

### 二 适时开水、开食

长途运输的雏鸡入舍后，应同时开水和开食，这样可以缓解运输应激。在雏鸡到达前30min，均匀放置好饮水器和饲料，加料应少喂勤添，前四天日饲6~8次，以后逐渐降低饲喂次数，以促进肠道和免疫系统的发育，增进肌胃的强受。同时，前3天在育雏区域铺设垫纸或塑料布开食有助于早期开食。经验证明：越早得到饲料和饮水的雏鸡比延迟数小时给料的雏鸡早期会得到更好的生长发育和体重均匀度。

### 三 培养早期食欲

在初的96h，雏鸡想吃东西，但不认识饲料，因此我们必须帮助它们，如在初4d雏鸡未形成良好的食欲，易造成以后均匀度差；让饲料更易采食，在初96h时应使用颗粒破碎料，但不能太细。

#### 四 挑选雏鸡

将来源于不同周龄母体的雏鸡分开饲养，通过采食和饮水的观察，挑出那些吃不到饲料的雏鸡，精心喂养，单独照顾；饮水采食2h检查嗉囊，看鸡饮水采食情况，直至雏鸡全部饮水吃料为止；如果开水、开食4h，仍有未完全饮水吃料的鸡，必须检查光照、饮水器高度、采食饮水位置等；雏鸡开水开食6h，应逐只挑选鸡只，把不吃不喝、只吃不喝、只喝不吃和其它有缺陷的鸡挑出单独饲养。同时，雏鸡周需要接种好几种疫苗，如在第1次接种传染性支气管炎疫苗时，可以同时挑出弱雏，单独饲喂；在第3~5天接种疫苗的时候还可以根据手感、嗉囊来挑出，并单独饲喂。

#### 五 提供充足有效的料位和水位

料位和水位特别注意分布均匀而且快，使雏鸡(确保雏鸡在前24h)在1m的范围内都能吃到料、喝到水。雏鸡入舍后1~2h就能适应新的环境，应经常检查，使所有的鸡都容易采食和饮水，并随日龄增加，逐渐增加料盘和饮水器数量。

影响均匀度的两个主要因素是遗传和管理上的差异，但以管理上的差异为主。因此愈早控制种鸡的均匀度，对种鸡生长发育愈有利。