

# 散养鸡苗批发 放养土鸡苗价格 纯种土鸡苗孵化场

## 正宗本地土鸡苗供应

产品名称	散养鸡苗批发 放养土鸡苗价格 纯种土鸡苗孵化场 正宗本地土鸡苗供应
公司名称	四川亿鑫和家禽育种有限责任公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:4.2 (kg) 成都:98 (%)
公司地址	成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号
联系电话	17369032651 13320986593

## 产品详情

由新城疫病毒引起，一年四季都能发生，发病急、来势猛、传播快、死亡率高。病鸡一般表现为呼吸困难、腹泻，粪便呈绿色，精神沉郁并有神经症状，头部和面部肿大，产蛋停止等，敏感鸡群的死亡率高达90%~100%。预防措施：以疫苗免疫为主要方法，3日龄用新支二联苗滴鼻，10日龄用单克隆苗饮水免疫，30日龄重复一次，60日龄用I系疫苗注射免疫。在做好免疫的同时，还要加强消毒工作，如发现病鸡应迅速隔离，并进行无害化处理，以确保治疗效果。

### 二 传染性法氏囊炎

由传染性法氏囊炎病毒引起，本病可对养鸡业造成严重危害。临床症状为病鸡排白色或浅绿色稀粪，精神萎靡，头下垂，眼睑闭合，羽毛蓬松，极度衰竭而死。预防措施：1~7日龄用传染性法氏囊弱毒苗饮水免疫一次，24日龄再免疫一次。预防时，应加强鸡舍消毒，减少应激，供给充足的饮水，其中可添加5%糖、0.1%食盐，以提高鸡抗病力。

### 三 鸡传染性支气管炎

由传染性支气管炎病毒引起的急性高度接触传染性的呼吸道病，鸡是本病的自然宿主。病鸡以出现气管啰音、咳嗽、打喷嚏为特征，可使幼鸡死亡，成年鸡产蛋量明显减少，本病各龄鸡都可感染，而以6周龄以下雏鸡易感。病的传播迅速，几乎在同一时间内有接触史的易感鸡都发病。防治措施：3~5日龄雏鸡疫苗滴鼻或加倍剂量饮水免疫，1~2月龄时，再用疫苗加倍免疫。本病尚无治疗药物，早期使用抗生素可防止继发感染，必要时可对症治疗，如给鸡群饮用0.5%~1%的苏打水，连饮3天，第4日起，逐渐减少药量，一般用药7天，可降低死亡率。

### 四 鸡白痢

由沙门氏菌引起，主要侵害2~3周龄以内的雏鸡，以急性败血症和排出白色浆糊便为特征，发病率和死

亡率均较高。病鸡表现为精神、食欲差，翅下垂，羽毛松乱，喜蹲伏，排黄白或绿色粪便。防治措施：预防鸡白痢的关键在于及时清除和淘汰鸡群中的带菌鸡，应从无白痢的种鸡场引进雏鸡，发病时可用氟哌酸、环丙沙星或恩诺沙星饮水治疗。

## 五 禽霍乱

是由某些血清型的多杀性巴氏杆菌所引起的禽类的一种急性传染病，除鸡外，鸭、鹅等水禽也可感染。其临床特征是，急性型病禽发生严重的下痢和败血症，慢性型则发生肉髯水肿和关节炎等症状。禽霍乱分布广泛，对养禽业的危害非常大。防治措施：预防本病的关键在于做好平时的饲养管理，认真执行禽场卫生防疫制度。雏鸡可于30日龄肌肉注射禽霍乱灭活苗预防，轻度症状的治疗可选择磺胺类药物、抗生素、喹乙醇等药物治疗。

## 六 大肠杆菌病

鸡大肠杆菌病是由某些血清型的大肠埃希氏杆菌所引起的鸡的一系列疾病的总称。本病是条件性治病，常在环境发生改变时发生。临床症状和病理变化多种多样，以引起鸡的心包炎、肝周炎等各脏器的炎症为特征。预防措施：加强鸡群的饲养管理，降低饲养密度，对禽舍和运动场定期消毒，同时保证饲料和饮水的清洁。在雏鸡开食时，把药物混合在饲料或饮水中，让鸡只采食，可起到一定的预防作用，常用的药物有新霉素、庆大霉素及呋喃类药物等。