

中梨4号3公分梨苗移栽前后施肥技巧

产品名称	中梨4号3公分梨苗移栽前后施肥技巧
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

注意疏花疏果，要保留梨树两边的花。20厘米左右留一个果子，施肥方法适于盛果期树和结果树生长季节内追肥采用。开沟时顺水平根生长的方向开挖，可以避免伤根。可隔年或隔次更换放射沟位置，扩大施肥面，促进根系吸收。将小的去掉留下大的，较密的，上下的去掉，将畸形果，病果要及时处理。还要注意天气情况，阴雨天气及时排水，多施叶面肥。影响植株生长和减产，同样结合两种方法防治，越冬前将植株周围的杂草杂物清除，减少虫源，发病时用药剂喷洒。

生长期间，要保持梨园土壤内有萌芽水、花后水、催果水、秋冬水，水分不足要分期抗旱。2月上中旬萌芽初花期为3月中旬，盛花期4月上、中旬，4月下旬进入第1次生理落果，5月上、中旬开始第2次生理落果，7~9月为果实膨大期，11月中、下旬果实成熟。同时，在梨园四周要挖好排水大沟，防止渍害。在病虫害防治上，主要防好梨锈病、黑星病、红蜘蛛、梨木虱、潜叶蛾、梨大食心虫等。一般是看树留果。强壮树、健壮枝多留，反之则少留。树冠顶部多留，枝角小的多留。总的原则是疏弱留强，疏小留大，疏密留稀，疏上下留两侧。平均单果重245克，果皮橙红色、色泽鲜艳，果顶脐突出、脐孔小、闭脐多、果形美观，果肉脆嫩、汁多、化渣、无核、风味浓甜、富有香气。可溶性固形物含量13~15%品质佳。一般每隔18 - 26厘米留1~2个果。不易形成花的品种，要考虑隔芽留果的办法来保证稳产。

果肉色泽白色，果肉质脆，果肉细，果肉石细胞数量少，果肉汁液数量中等，成年树或密植果园，根系已布满全园时采用。先将肥料均匀撒布全园，再翻入*中，深度约20厘米。优点是全园撒施面积大，根系都可均匀地吸收到养分。与放射沟施肥法轮换使用，可发挥大肥效。果实风味甘甜，果肉稍有香气。果实7月上旬成熟。棚架栽培可将树体控制在一定高度，给整形修剪、花果管理和病虫害防治等田间操作带来了极大方便，同时也有利于田间机械化作业。