

# 新梨7号3公分梨苗移栽前后施肥技巧

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 新梨7号3公分梨苗移栽前后施肥技巧 |
| 公司名称 | 泰安市龙烁苗木有限公司       |
| 价格   | 2.00/棵            |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 山东省泰安市开发区         |
| 联系电话 | 15166482777       |

## 产品详情

追肥以肥为主，在萌芽前、花后、果实膨大期及果实发育期进行施用。苗木定植后10~12天芽眼开始萌动，这段时间不浇水，以免降低\*温。芽眼萌发后，如果嫁接苗嫁接口以下萌蘖新梢，立刻剪除。一年生苗木根据\*壤墒情，进行浇水。一般全年浇12~15次，前3次水不追肥，见到新梢卷须后10g/株追施尿素，追3次即可。树木萌芽前、落花后、果实膨大期及封冻前各浇1次水，干旱年份可根据情况增加灌溉次数。由于'新梨七号'自身花粉量少，自花结实率低，人工或壁蜂授粉可显著提高坐果率。

花期易遇晚霜危害的梨园，特别是海拔较高的山地梨园，要注意花期防霜害。主要方法有增施肥料，加强树势；花前灌水；熏烟防霜等。刮树皮可消灭潜伏在果树粗皮、翘皮及树干裂缝中的大量越冬的病菌和害虫。新梢生长到5cm时即可进行先抹除萌发的副芽、弱芽及过密芽，避免留枝过多，导致架面过分密集、通风透光差，既给病害发生创造有利条件，同时也影响果实的品质。摘心：结果枝的新梢花前进行摘心，花序以上留4~6片叶摘心；营养枝留8~10片叶摘心。副梢管理：结果枝上的副梢，果穗以上留2片叶摘心，对主梢摘心后，顶端萌发的2个副梢各留4~5片叶摘心。2次、3次副梢留3~4片叶反复摘心。营养蔓上的副梢留2片叶摘心，顶端2个新梢留4~5片叶反复摘心。冬季或早春用刮刀或镰刀把果树的老皮轻轻刮掉，然后用"护树将军"在树干涂抹，使病皮迅速脱落，清除菌源。对刮下来的老皮要集中烧毁。梨树前期结果主要靠短果枝群。而短果枝群结果早，易衰弱。因此，在回缩上比苹果树较早较重，应当细致修剪。同时梨树多年生枝回缩后，对于第1枝削弱不太明显。因此，梨树回缩一般不留“跟枝”，有利于保护剪口下第1枝。

果点中大而密。果肉白色，肉质酥脆、多汁，石细胞极少，风味淡甜，品质优。2

月上旬，为促进根系活动灌水。灌水量以湿润30cm

以上\*层即可，过深会影响地温的回升。花前水：设施葡萄从萌芽至开花需40天左右，花前需灌1~2次水。花前后1次灌水，不应迟于始花前1周。结合浇水每株追施20g氮肥。果心小，可溶性固形物含量12.1%，采收期长，1个月左右，分期分批采收。果实耐贮藏，冷藏条件下可贮至翌年四五月份

