

红香酥梨3公分梨苗移栽前后施肥技巧

产品名称	红香酥梨3公分梨苗移栽前后施肥技巧
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

在果园内，建立压力系统（压力罐），将可溶性固体或液体肥料，按土壤养分含量和果树的需肥规律及特点，采后修剪的目的在于调节秋梢萌发期和提高秋梢质量，使枝条分布均匀，提高光合效能，集中养分。采后修剪一般在采果后20天内完成，先施肥后修剪，树势弱，挂果多树可待叶片转绿后再剪，如需培养三次秋梢的要早修剪；培养二次秋梢的可推迟修剪，即可在第1次梢抽出前枝条芽眼饱满时修剪并结合松*。配兑成的肥液和灌溉水一起，通过滴灌管道系统自动地为果树供水、供肥。生长季5~6次随水施肥，生长前期以氮肥为主,7月后以磷钾肥为主,每产1000千克梨果，施肥量折合纯氮5~6千克、磷3~4千克、钾5~6千克。

同时注意对下垂结果枝组的科学更新，过于衰弱的可将结果母枝回缩到基部抽生的健壮更新枝处，有短截和疏剪。短截一般用于剪除落花落果枝、果枝的龙头丫和徒长枝；疏剪用于剪除过密枝、阴枝、弱枝、重叠枝、下垂枝等。修剪时宜从树冠内部到外部，从大枝到小枝、避免剪后树冠外围局部空缺大。密蔽封行的果园要进行间伐和回缩修剪，回缩修剪在采果后15天进行，即除将病虫枝，衰弱枝剪除外，对外围枝梢算起的2-3级枝进行剪短。每枝只留下1-2条即可。回缩比例不应超过全部结果枝的20%。结果枝组枝轴基部粗度超过2厘米的，要及时更新，疏除后重新培养下垂结果枝。疏去那些果形小、萼张开不突出的果。疏果的原则是留优去劣。先疏去那些病虫果、歪果、小果、锈果、叶磨果，如果还超量时进一步留优去劣，调节在全树的分布。为了安全疏果可分两次进行，先间果后定果。只有果实阳面略着红色。盛花后20天左右套袋，须选用透明的塑料袋，套纸袋或不套袋着色不理想，果面粗糙不平，果实成熟后可带袋采摘、贮藏。

在梨树枝干生长过程中，要注意对长势较旺盛的枝干进行修剪，避免因为徒长影响主干的营养。成年结果树树冠较大，枝梢较多，树体消耗较大，修剪宜重。幼年树树冠小其承担着扩大树冠和结果的任务，修剪宜轻。修剪后能使上层叶片接受直射光，下层叶片能接受反射光为度。中心干延长枝需要及时短截，从而培养大中型结果枝组，利于坐出大果。分布在各个部分的枝组，要大中小、立侧垂、长短、高矮合理搭配，大枝组占空间，小枝组补空隙，错开着生，呈波浪状，要达到多而不挤，枝枝见光。

